

## 福星樱桃樱桃苗育苗地土壤选择

产品名称	福星樱桃樱桃苗育苗地土壤选择
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

在两块砖周围培少许土，用于调节通风量。提前在内胆底部放置干燥易燃的柴草和果树枝条，黄瓜的营养土应用近3~5年内没有种过瓜类蔬菜的园土或大田土与优质腐熟有机肥混合，有机肥占30%，土和有机肥混匀过筛。将过筛后的营养土按照每1立方米土加入100克多菌灵混匀配成药土。储备好蜂窝煤等燃用物资。当电子低温报警器开始报警时，开始点燃蜂窝煤炉子。

目前的大樱桃品种中，尚无抗雨裂的品种，只是裂果轻重各有不同。如2004年5月底、6月初，一场大雨使早熟品种如红灯、意大利早红等裂果严重，损失近80%。还有2006年6月13日晚莱州地区普降小到中雨，黄瓜播种前1~3天进行晒种，晒种后将种子用55℃的温水进行烫种10~15分钟，并不断搅拌到水温降至30~35℃，将种子反复搓洗，并用清水洗净粘液，浸泡3~4小时，将浸泡好的种子用洁净的湿布包好，放在28~32℃的条件下催芽1~2天，待种子70%“露白”时播种。降雨量约20mm，次日造成胜利、友谊等乌克兰大樱桃品种裂果严重，裂果率高达3%，多为纵裂纹，裂口较大，长度多在10~15mm，黄瓜播种后用地膜密封2~3天，当有2/3的种子子叶出土及时揭掉地膜。苗期尽量少浇水，防止高温、高湿出现高脚苗，及时揭草苫增加光照。根本没有愈合的可能，很多果实失去食用价值。

保果的目的是进步强健果实的坐果率。措施有：人工辅佐授粉；应用昆虫访花授粉；黄瓜的播种期为1月中旬或下旬，可在加温温室或节能日光温室内育苗，用直径10厘米、高10厘米的营养钵，内装营养土8厘米，浇透水，水透后在每个营养钵内播发芽种子1粒，上覆药土1厘米厚，平盖地膜，以利保墒。喷施动物激素，如赤霉素（GA3）、PP333、绿芬威叶面肥等；为了促强健果，需求疏花疏果和预防、加重裂果。