

福晨櫻桃櫻桃苗綠色無公害栽培技術

| | |
|------|------------------|
| 產品名稱 | 福晨櫻桃櫻桃苗綠色無公害栽培技術 |
| 公司名稱 | 泰安市龍燦苗木有限公司 |
| 價格 | 2.00/棵 |
| 規格參數 | |
| 公司地址 | 山東省泰安市開發區 |
| 聯繫電話 | 15166482777 |

產品詳情

在果實發育期，於傍晚，通過帶狀噴灌，噴灑地下井水來降低果園溫度，減少果實夜間呼吸及新梢旺長。至檢驗pH為中性時即可。播種時苗床先淋足底水，用細砂或碎土拌種，均勻地撒於苗床，覆0.5厘米厚的松土。在幼苗長出2~3片真葉時要進行間苗，5~6真葉可移栽。果實轉白至成熟前保持土壤濕潤，避免忽干忽濕，去年紅燈、美早裂果比較重

在土溫低於15 的情況下，插條的生根力很弱。而30 以上的高溫會導致插條葉片變黃、落葉和生根晚等障礙。一般從樹齡小的母樹上選取的插條生根力較強。適時澆水大櫻桃樹既不抗旱，也不耐澇。聖女果播種前種子要經消毒處理，防治西紅柿早疫病先用溫清水浸種3~4小時，再浸入40%福爾馬林100倍液中，20分鐘後撈出並密閉2~3小時，用清水沖洗乾淨。防治西紅柿病毒病同樣先用清水浸3~4小時，然後轉入10%磷酸三鈉或2%氫氧化鈉水溶液，浸20分鐘取出，用清水沖洗數遍而北方地區雨水又不均勻，在早春澆好花前水的基礎上，如夏季干旱，還要澆好硬核水、採前水和採後水。根據北方雨水規律，在6月下旬應注意防旱，根據土壤墒情，及時澆水；在7~8月為多雨季節，要做好園內的排水防澇工作。

對高溫的敏感對於低溫同樣也是如此，櫻桃植株冬季溫度不能低於20 ，聖女果種植地選用前茬沒有種過茄科植物、排灌方便的田塊，土地耕耨後按行距開植溝，施下基肥後作高畦，畦以南北走向為原則，畦寬1.4~1.7米（包溝），株距為45~55厘米，每畝定植在1600~2000株之間，選壯健苗定植，定植後即澆水。溫度過低的話會造成植株開裂以及流膠的現象。櫻桃樹既不耐寒冷，也不耐旱，適宜於年平均氣溫10°到15°地區種植。