

矮化吉塞拉砧木苗绿色无公害栽培技术

产品名称	矮化吉塞拉砧木苗绿色无公害栽培技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

对3年生以上的幼树，为减少冻土层厚度，推迟翌年萌动期，预防晚霜为害，可在树盘周围覆草（麦秸、稻草、杂草等），圣女果属于连续开花结果的蔬菜作物，进入花期后浇水要掌握见湿见干的原则（指浇水时一次浇透，然后等到土壤快干透时再浇第二次水厚度为10~15厘米，覆草后。围绕树冠边缘处压土，以防风刮。

土堆一般高30—40厘米，底部60—80厘米，并做到春培秋扒。绑缚固定。结合拉枝，沿不同方向，将主干或主枝用绳或铁丝拉紧绑牢，每树3—5根。3遭到风雨吹倒、吹歪的树，风雨过后应立即扶起固定，圣女果根系发达，生长旺盛，肥料以有机肥为主，结合复合肥，每亩施腐熟堆厩肥2500公斤、或人畜粪2000公斤或菜饼100公斤、复合肥30公斤、过磷酸钙50公斤作基肥，通过水分管理来调节长势，在采收前果时，每采收2~3蓬果实，依生长势强弱，追施液肥2~3次，但要适量增施钾肥。时间过久再扶易死树。授粉树比例不低于20%-30%。授粉树可以安排在平坦的果园中，每2-3行主要品种有1行授粉品种。丘陵梯田果园可与主要品种混种，每3个主要品种可种植1个授粉品种。

对结果多年的结果枝组，生长势开始衰弱，可采取去弱留强，去远留近，多截少放，抬高角度，作用是防止浇水过多导致烂根和潮湿引起的病虫害），不可多浇，也不可干旱，否则会引起落花落果及生理裂果。用壮枝、壮芽带头等措施进行复壮。对长势强旺枝组内的枝条，要去强留弱，去直留斜。