

# 山东桃树苗 泰安桃树苗批发

产品名称	山东桃树苗 泰安桃树苗批发
公司名称	泰安市建岳农业科技有限公司
价格	.60/棵
规格参数	品种:桃树苗 型号:1 厂家:建岳农业
公司地址	山东省泰安高新区北集坡办事处季家庄村（注册地址）
联系电话	0538--8912239 18562357999

## 产品详情

山东桃树苗品种其它品种：红冠蜜，寒露蜜，瑞阳，黑桃，瑞雪，春晓，鲁红618，黑桃，白如玉，金秋红蜜，黄金蟠，瑞蟠桃苗，映霜红，美脆桃、加纳岩、锦绣黄桃、冬雪桃等品种。

早熟36-3油蟠桃:果实扁平形，缝合线明显，两侧校对称，果顶凹无裂痕。果形较大，平均单果重95克，大果152克以上，果皮底色绿白，表面光滑无毛，整个果面玻鲜红或玫瑰红色，艳丽美观。果肉乳白色，肉质细，硬浴质，汁液丰富。风味浓甜，有果香，品质优良。果核小，扁圆形，硬核，果实可食率95.6%，不裂果。

36-5油蟠桃:新培育黄肉油蟠桃品种，硬溶质，耐运输，均果180克，大果200- 250克，不套袋红色，套袋金黄色，果型端正，缝合线闭合完美，无酸味，甜度高，香味浓郁。黄肉，含糖高不裂果，自花授粉，极丰产。是早熟油蟠桃的优良品种。果肉橙黄色，不裂果，硬度好，含糖量19%，挂果时长超过15天，个头比风味皇后大。该品种在山东泰安地区6月中旬成熟，比中油蟠桃5号早熟5天。

黄金蜜桃4号 9日中旬成熟，果肉金黄，口感纯甜，果面全红，套袋里外金黄色，黏核，单果重350克左右，可性固形物17%-21%，品质极上，自花结实，极丰产，成熟后挂树月余不软。

金秋王桃树苗价格：9月中旬成熟中秋节上市的桃，平均单果重650克，大果1000克，果个大小整齐，果形端正，果实全红，浓甜适口。由于它的上市时间是中秋节与国庆节这双节期间，因此它的销量就尤为可观，占据市场。中国人都比较注重节日，是传统的习俗，因为它个头大，送礼是好选择。

映霜红桃树苗批发：果实经济性状果实圆形、果形端正。果个大，平均单果重400克，大果重560克。底色黄绿，果面着鲜艳玫瑰红色，光彩亮丽，极其漂亮。果顶平。果面光洁，茸毛少，梗洼浅，无果锈。果皮厚，光滑。果肉乳白色，近核处粉红色；

齐鲁巨红桃苗(晚熟桃):属大型果,平均单果重375克;果实近圆形,果顶圆平;果面红色、着色面积50%至75%;果肉乳白色,近核处有红色素;果实含可溶性固形物14.4%,0感好,香味浓;该品种具有极晚熟、果大、外观美、品质优等特点。在泰安地区4月初开花,10月下旬至11月初果实成熟,果实发育期200天左右。该品种树势强健,以中短果枝结果为主。是中国北方晚熟优质大果型桃新品种。

秋彤桃:引进品种,中秋节前成熟大果型离核桃,成熟期8月中下旬到9月上旬,挂树到9月中旬还有果在树上,果重250~450克,大果可以达到630克,白肉离核,浓红,平顶圆形,果形端正,浓甜味香,光洁稀毛,不用套袋,成花快,花粉多,丰产性高。根据一带一路政策果实收购价每斤7元左右,精品果售价每个16元。

黄金蟠桃:7月底成熟,果重240~500克,离核,核小肉厚,套袋果摘袋后2-6天即成极其诱人的金黄色,果肉黄色,细嫩,风味浓郁,似菠萝,芒果的芳香,口感佳,自花结实,无落果现象,丰产,收购价每斤8~15元。

锦绣黄桃苗:8月下旬成熟,平均单果重260克,大果重450克,果形圆正,果面黄红色,果肉金黄色,非常漂亮美观,肉质细,味甘甜,有香气,含糖15%,品质上乘,花粉量大,自花授粉,坐果率高,丰产,耐贮运,采后自然存放7-10天。株价:50公分3.0元,80公分3.5元,1米4.0元。

金皇后桃树苗(黄桃):属中晚熟品种。果实圆形,端正,缝合线明显,果顶微凸,两半部对称果实较大,平均单果重125克,大小均匀,适于加工。果实近圆形,两半部较对称。果皮金黄色。果肉橙黄色,肉质为不溶质,细密,韧性强,纤维少,汁液较少,含糖量高,可溶性固形物含量15%左右。在山东泰安果实于9月下旬成熟,耐贮运,冷藏条件下可贮藏到12月份,为理想的鲜食加工兼用品种。加工性能良好,可食率高,成品金黄鲜亮,有光泽,肉质细柔,酸甜适口。

晚黄金2号桃苗:该品种4月上中旬开花,5月上中旬疏果,5月下旬套袋,8月下旬果实分批采收。采收期20--30天,带袋采摘,脱袋后立即销售,不需要着色。果实圆形,果个大,平均单果重321克,大果重775克。果肉色泽为黄色,富有光泽,离核,种子椭圆形。一级果高达92%,单株产量44.3kg,亩产5000斤,果实脆甜,可溶性固形物17.5%,可食率94.7%。引领换代新品种推动栽培新模式实现果业现代化。

山东桃树苗 泰安桃树苗批发桃树的花后管理;

一、及时夏季修剪 主要是抹芽和摘心。抹芽:一般在萌发至生长到5厘米之前进行,即抹掉树冠内膛的徒长芽和剪口下的竞争芽。摘心:把正在生长的枝条顶端的幼嫩部分去除。在新梢生长前期,摘心能促使早发副梢,增加分枝级次,形成较多的结果枝,从而有利于幼树成形和提早结果。摘心时间应在5月中旬至7月初进行。一般在新梢长到40厘米左右时进行摘心。对背上竞争枝、旺枝还要进行疏枝。

二、肥水管理 在生长前期以氮肥为主,生长中后期以磷钾肥为主。钾肥应以硫酸钾为主。硬核期肥在5月下旬至6月上旬施入。极早熟品种硬核期时间短,可不施。氮、磷、钾肥要配合施,以磷、钾肥为主。催果肥是在成熟前20-30天施,以钾肥为主,配合少量氮肥。在秋冬季施有机肥较多的果园可少追肥。应多施有机肥少施化肥,尤其是氮肥。每次施肥后,必须进行浇水。

三、控制浇水 桃树花后至硬核期时,枝条、果实均生长迅速,需水量较多。但在硬核期,水分过多则新梢生长过旺,会引起落果。所以浇水量不宜太多。一般在果实采前20-30天进入果实膨大期,此时早熟品种在北方还未进入雨季需进行浇水;中早熟品种(6月下旬)已进入雨季,浇水量应视降雨情况而定。如浇水过多,会造成裂果和品质下降。

四、控制负载量 一般每亩果量控制在2500公斤左右。疏果要先疏去双果、小果和果形不正的果。树体上部的结果枝要适当多留果,下部的结果枝要少留果,以果控制旺长,达到均衡树势的目的。树势强的树

多留果，树势弱少留果。另外，定果时还要考虑果实的大小。一般长果枝留果2-4个，中果枝留1-3个，短果枝留1个或不留。如果是长梢修剪，应在长果枝的中上部留果，基部不留果。弱果枝、花束状果枝和预备枝一般不留果。也可根据果间距进行留果，果间距为15-20厘米，依果实大小而定。