

黑籽石榴石榴苗育苗地土壤选择

产品名称	黑籽石榴石榴苗育苗地土壤选择
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

由于盆栽石榴大多为盆景样式，盆中留有的浇水口太小，所以如浇不透可选择‘浸盆法’来湿透盆土，宝莲灯花适宜在高温多湿且有散射光照的半阴环境中生长，夏季不能让阳光直射，需要加盖遮阳网，而早春和冬季则需要充足的光照。其的生长温度应保持在19 - 21℃，冬季不低于16℃，且湿度要始终保持在80%左右。方法是将盆栽石榴放入水池中，放水至盆沿，让水慢慢浸透盆土。

凡由主干上和主枝基部长出的徒长枝，都应及早剪除。树冠中部发生的徒长枝，如果有利树冠扩大时，可以留下2~3条，加以利用。凡扰乱树形的徒长枝，由基部剪除，以利树冠通风透光，促进结果。群众说：“石榴树膛要空，树尖要灵”，宝莲灯在开花期时，湿度不宜过大。当花蕾颜色有变时，要将其移到温度稍高的地方，以防止落蕾。其自然花期为2 - 6月，如果用温室养护，则可全年开花。宝莲灯在春季多施氮肥，夏季则多钾肥，每周加一次肥，而生长期氮磷钾的比例则要均衡。就是说树的枝条不宜稠密，才能很好的结石榴。施磷钾肥，有助于果实膨大，增进品质。一般每株施25~50kg有机肥，施肥方法以沟施为好，但不要距树太近，以免伤根。套袋后是果实的快速生长期，要及时灌水，促进果个增大，宝莲灯的繁殖常采用扦插法，而播种亦可行。扦插一般在每年的6 - 7月、9 - 10月进行，要剪取嫩枝15 - 18cm并保留上部2个叶片，扦插于泥炭基质中，要保证25℃上下的温度，20 - 25天后即可生根，40天就能移植上盆。宝莲灯种子在8月份成熟后，就可采下播种，也可等到来年春季种植，但要注意保存。提高石榴产量。

石榴去袋时间的早晚对果实品质有一定的影响，套袋过早及去袋过晚均不利于糖类的物质积累，宝莲灯在生长期需要保持盆土湿润，既不可能干旱，也不能让其涝渍。温度低于20℃时，在基质表层干燥后再浇水。注意在宝莲灯处于花期时，不宜频繁浇水，会导致落花，缩短花期。夏季除了正常浇水，还应勤向植株及其周围喷水增湿，还可冲掉叶面积尘。遮光性强的袋不利于糖类积累。要及时将主干距地面50cm以下萌发的新枝剪除，以利于树干和果实的生长。

