

兰丁樱桃树苗价格及报价

产品名称	兰丁樱桃树苗价格及报价
公司名称	泰安开发区鸿程园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	类别:矮化樱桃树苗 类型:大樱桃苗基地 品牌:鸿程农业
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处篦子店村607号
联系电话	15662047666

产品详情

兰丁樱桃树苗价格及报价若土壤水分不足，会影响树体发育，形成“小老树”，导致产量低，品质差。土壤：大樱桃属于浅根系树种，主根不发达，适宜种植于土质疏松、不易积水的地块，以肥水良好的沙壤土或沙质壤土为好，不喜爱黏质土，在黏性土壤中根系发育不良。

进入8~9月份可喷施0.3%的磷酸二氢钾2~3次，促进枝条成熟和花芽分化。五、雨季排水樱桃树穴外围开排水沟，将过多的根部水从树穴内排除，减少浇水过量和雨水过多时的影响一、不同树龄施肥比例幼龄时期的甜樱桃树，树体处于扩冠期，其营养生长旺盛，对氮、磷需求较多，施肥应以氮为主，氮、磷、钾的适宜配比应为2:1。

它们主要以幼虫形态在树体内越冬，天气转暖时开始活动，蚕食枝干。幼虫期防治从清明前后到五一这段时间，要仔细观察果树枝干，如果发现新鲜的粪便，说明越冬幼虫开始危害枝干，将粪孔清理后，用铁丝沿虫洞插入蛀孔并转动以刺杀幼虫或者将菊酯类或毒死蜱等有机磷类农药稀释后用注射器注入虫孔，然后将上下两个洞口用黄泥封死。

摘心留枝长度应根据枝条着生空间和枝的不同用途而定。作为骨干枝，留枝较长，应在40cm以上。当新梢生长较长，而留枝较短，摘心部位已半木质化时，需用剪子修剪称剪梢。剪梢的作用比摘心强烈。1.3拉枝：将强旺枝拉向有空间的地方，弥补骨干枝的不足。

叶片受害，病斑呈灰绿色或灰白色近圆形病斑，病斑周围呈暗紫色，后期病斑中部产生黑色小颗粒，呈同心轮纹状。病菌以菌丝在僵果、病组织、粗糙皮层内越冬，翌年随雨水传播。防治药剂：甲基硫菌灵、代森锰锌、苯醚甲环唑、苯醚甲环唑？

合理夏剪。樱桃幼龄树往往不容易成花，必须采取合理的夏季修剪，如在5月下旬至6月上旬，对背上枝掐尖或留30厘米剪梢，在7~8月份进行拉枝，骨干枝拉至80度左右，辅养枝、结果枝拉至90度以上，控制

营养生长，促进花芽分化和花簇状短果枝形成，可提早结果。

如果土壤盐碱化严重，可土施过磷酸钙或硫黄粉，或施用酸性肥料来调节，酸性肥料施用量要根据土壤的pH值来决定，pH值的测定可采取pH值试纸测定法。3、风害在多风地区栽植甜樱桃，各季节中都可能对树的生长发育造成危害。