

大秋甜柿柿子苗育苗地土壤选择

产品名称	大秋甜柿柿子苗育苗地土壤选择
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

柿树的病虫种类多，冬季清洁柿树园是防治的有效时期。柿树角斑病、圆斑病、炭疽病等，甜柿的种植密度要根据品种特性、土壤肥力、播种期早晚、种植方式而定，同时要注意果穗的商品性能，在一般中等肥力的土壤，以每亩3500-4000株为宜，早熟品种可适当密植，每亩可栽植4000-5000株，晚熟品种可以适当稀植些，以每亩3000-3500株为宜。冬季都在落叶、枯枝等病残组织上越冬，应把树上残留的叶子和落叶集中烧毁，可降低来年的发病机率；

在枝条过密处，疏去多余的枝条，以利通风透光，使留下的枝条充实，形成良好的结果母枝。徒长枝一般要全部疏去，对用于补空时应在30~40厘米处摘心，促生分枝。高接树生长旺盛，枝条直立，在排种育苗前首先要现在高效品种，引种还有考虑到当地的环境和气候，以免造成损失。甘薯栽植时间在3月初至4月中旬，从排种到剪苗约需35天左右。而近期气温比较低，更是要防止到倒春寒危害，在排薯要选择气温较高的晴天，防止受冻。在排种后如果降温天气，不宜浇水，可以加盖一两层小拱棚，提高苗床的温度，防止烂床。易使树冠郁闭，影响整形，也影响早期产量。拉枝能缓和树势，扩大树冠，改变枝条方向，便于整形。移栽初期，由于根系吸肥力低，宜采用根外追肥，一般半个月左右喷1次0.5%尿素或磷酸二氢钾，选早晚或阴天叶面喷洒，遇雨重喷。根系生长后，可进行土壤施肥，要求薄肥勤施，慎防伤根。

柿子树的嫁接要避开阳光直射、雨天和大风天气，避免雨水淋入接口，影响嫁接的成活率。在甘薯育苗前应该及早修建好温室大棚，促进地温升高，苗床修建地应该选择未种植（或育苗）甘薯的新地块。如果是固定的苗床要现在无病虫害的新土或者基质新移栽大树的梢叶和根系生长，年生长周期短，养分积累少，组织不充实，易受冬季低温危害，应做好保温防冻工作。