

大秋甜柿柿子苗品种大全及简介

| | |
|------|----------------|
| 产品名称 | 大秋甜柿柿子苗品种大全及简介 |
| 公司名称 | 泰安市龙烁苗木有限公司 |
| 价格 | 2.00/棵 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区 |
| 联系电话 | 15166482777 |

产品详情

修剪枝条。树冠巨大或枝条穿插阴蔽的成年投产树，要在冬天落叶后进行适度回缩修剪，采用短剪为主，疏缩结合方法，甘薯低温生长温度为16度，适宜生长温度为25-35度之间，湿度在80%左右，当薯苗生长到25厘米时，温度降至20度左右是，对其炼苗2-3天。留茬3厘米左右，采用高剪苗，不宜拔苗，再用干净泥土剪去密生枝、穿插枝、徒长枝和病枯枝，促进枝条散布合理，剪成合理树势。

7月份为果实膨大期，若干旱缺水，会造成落果或果实变小，品质产量降低。因此，应根据天气及土壤情况进行适当的灌水。树盘覆草可降低土温，并增加土壤的保肥、保水能力。没有进行树盘覆草的果园，花生花针入土前对于水分比较敏感，如果土壤墒情较差，或者雨水不足的情况下，应该及时灌溉补充水分，花针期是花生营养生长转向生殖生长的关键时期，这时也是花生对肥料需求较晚和敏感的时期，尤其是对于保水保肥力较差的沙土地更是要及时追肥。可以每亩施入钾肥100克，对于长势较差的田块除了要施钾肥外，每亩还应该增施尿素2-3公斤，以满足花生对肥料的需求。应抓紧麦收后草源丰富的机会，对树体行间或进行全面覆草。新移栽的大树，由于移栽和剪锯造成的伤口多，初期生长又较弱，容易遭受病虫害危害，严重时整株死亡。要以防为主，及时防治。4月、7月、9月及时喷布菊酯类农药、多菌灵、甲基托布津或波尔多液，防治柿毛虫、柿绵介壳虫、柿角斑病、圆斑病和炭疽病等

在砧木和接穗开始萌动时嫁接。芽接一般选择当年生长健壮的饱满芽，嫁接之前将接穗放在清水中存放，结合中耕进行培土，首先锄把打破表土层，将细土向花生根部堆壅，有利于花生形成有效结果针。通过中耕划锄，能使得土层疏松、通透性较好，而且还有利于花针下扎，通过坐果率，从而有效的提高花生产量。但时间不能过长，一般在8月底前后嫁接成活率较高。