RCCMAX灌注式细胞培养 微重力效应 RCCMAX

产品名称	RCCMAX灌注式细胞培养 微重力效应 RCCMAX
公司名称	苏州乾芸仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市金枫南路1258号金桥工业园D栋4楼
联系电话	13862149980

产品详情

三维细胞培养：使用三维组织培养模具和三维细胞培养板在凝1胶支架里全自动三维培养

三维组织培养模具和三维细胞培养板类型丰富：

1)三维组织培养模具有三维线形培养加载基1站模具和三维梯形培养加载基1站模具

2)具有氨基酸包被表面、胶原（I型或IV）包被表面、弹性蛋白包被表面、ProNectin（RGD）包被表面、层粘连蛋白（YIGSR）包被表面的三维培养板。

科研者根据自己的细胞，有针对性的选择适合包被表面三维培养板

3)具有可牵拉双轴向和单轴向拉力刺激加载三维组织培养板。

污染途径 污染物，连续灌流RCCMAX，特别是微生物常通过下列途径进入培养体系，造成污染

1、空气：空气是微生物及尘埃颗粒传播的主要途径。空气流动性大，如果培养操作场地于外界隔离不严格或消毒不充分，外界不洁空气很容易进入造成污染。因此，培养设施不能设在通风场所。无菌操作应在净化台内进行，工作时要带口罩，以免因讲话、咳嗽等使外界污染进入操作面，造成污染。

2、器材：各种培养器皿、器械消毒不彻底和洗刷不干净导致污染，另外需要对培养箱进行定期消毒，防止形成污染

3、操作：实验操作无菌观念不强，技术不熟练，自动更换培养液RCCMAX，使用污染的器皿或封瓶不严等，都可以造成污染。培养两种细胞以上时，操作不规范，交叉使用吸管或培养液、瓶等有可能导致细胞交叉污染。

4、血1清：有些血1清在生产时就已经被支原体或病毒等污染，变成了污染。

5、组织样本：原代培养的污染多数来源于组织样本；取材时碘酒消毒后脱碘不彻底，可造成碘混入组织，细胞或培养液中，影响细胞细胞生长。

细胞培养常见问题：悬浮性细胞应如何继代处理？

一般仅需持续加入新鲜培养基于原培养角瓶中， 稀释细胞浓度即可，RCCMAX，
若培养液太多时， 可将培养角瓶口端稍微抬高，
直到无法容纳为止。分瓶时取出一部份含细胞之培养液至另一新的培养角瓶，
加入新鲜培养基稀释至适当浓度， 重复前述步骤即可。

1 品 名: RCCS‐4SCQ 重复使用三维细胞培养 独立4转头

2 标 配: 主机座X1，控制器X1，说明书X1，培养皿4pcs(1ml/2ml/4ml/10ml 供选择)

3 说 明:

3.1可重复是指培养皿除可以通过射线灭菌外，还可以通过高温、高压灭菌处理

3.2培养皿及培养皿阀头等均已灭菌处理

3.3附送培养皿规格有1ml，2ml，RCCMAX灌注式细胞培养，4ml，10ml供选择

3.4特殊设计的主机配合专用的培养皿使用，更适用于培养

3.5同时可培养4组样品，且每组均可根据实际需要进行独立地转速控制

RCCMAX灌注式细胞培养-微重力效应-RCCMAX由苏州乾芸仪器科技有限公司提供。苏州乾芸仪器科技有限公司是一家从事“ 三维细胞培养,TPP耗材,PCR操作台,可降解支架,离心机 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ RCCS,SYNTHECON,TPP,Biotix,Neua ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使乾芸仪器科技在实验仪器装置中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！