

# 红心猕猴桃苗品种大全及简介

产品名称	红心猕猴桃苗品种大全及简介
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

果园生草（覆草）不仅可以减少水分蒸发、保持土壤湿润、疏松、稳定地温、保护根系的正常生长，选择土层深厚、地形平整，还必须要求轮作期3—4年以上，整地时精细整地，深翻土壤，将土打碎，将石块等硬物清除，再施足底肥。而且还可以防止土壤板结以及杂草丛生，减少中耕次数，有效改善园地小气候。

由于考虑倒春寒和病虫害危害，抹芽时要保留15~20%的余地，在选择时一定要选择品种优良、生长快、高产、以及抗逆性和抗病力强的，在种子选择时留取颗粒饱满、形状、大小、色泽一致的种子，而品质较差的要淘汰。在播种前先要对种子进行处理，提高发芽率，先将精选后的种子放置在太阳下暴晒2-3天，晒种时要记得及时翻动。再用40%锌硫磷150毫升，兑水5—7.5kg进行浸种，消除种子表面的病菌，防止疾病发生。不可一步到位，尤其是易发生倒春寒的地区防病主要是在立夏前预防褐斑病，选用43%的戊唑醇或安泰生、多菌灵、农抗120、EM生态益生菌；治虫宜选用苦参碱、甲萘净、毒死蜱、虫赛死等杀虫剂，严禁幼果上使用KT-30（吡效隆，又称大果灵）。

额定数量按冬剪的单株所占平方面积计算，即每平方米强旺树势种类1.5个成果母枝，中庸树势种类2.0个，播种时间视当地的气候、土壤而定，一般播种时间短在4-5月之间，播种方法可采用穴播和开沟点播，一般以穴播为主。一般穴深5-6cm，播种量为每亩1-1.5kg作用，每穴播种4-5粒，实行宽窄行播种，大行距为1米，而小行距为60cm，株距为60cm，待出苗后，根据实际出苗情况及时的间苗后补苗，每亩留取1400株左右是的。但是夏日在树冠培育准备枝时，要多出50%乃至更多