

## 8518核桃核桃苗日光管理介绍

产品名称	8518核桃核桃苗日光管理介绍
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

### 产品详情

雌花期5~7天的品种，坐果率高达80%~90%，8~11天的品种坐果率在70%以下，12天的品种坐率仅为36.9%。水稻齐穗后，不宜在根际追施氮肥，而追施叶面肥和植物生长调节剂是防止水稻早衰和贪青晚熟的辅助措施。按常量喷施稀土二氢钾等叶面肥，可促进灌浆、促进早熟增产，一般施用1---2次即可。花期如遇低温阴雨天，则会明显影响正常的授粉受精活动，降低坐果率。

一般认为，一年保证5-6次灌水。3月下旬,浇萌动、展叶水。进入灌浆后期实行间歇灌溉，干湿交替。水层2---3厘米，待其自然渗干，达到进入不陷脚，土壤不裂缝时，再灌下茬水。要掌握好停水期，停水期一般在水稻齐穗后40天左右，或收割前7---10天。对地下水位高、盐碱较重的稻田，应以保水为主，并适当推迟停水期，以防止土壤返盐、水稻早衰。对冻害发生的核桃地块3月初灌早春水，连续灌水2次，以加速土壤解冻，缓解冻害；增加空气湿度，减缓抽干。5月中下旬浇果实膨大和花芽分化水。7月底浇果实硬核水。施基肥水,果实采收后,结合秋施基肥灌一次水。土壤上冻前灌足冬水。

果树生长后期喷施磷酸二氢钾肥,可提高果实品质。一般在开花期(4月中下旬)、新梢速长期(5月中旬)、摘田一般应在水稻对水分反应不敏感的时期进行，即在分蘖后期到幼穗分化初期比较适宜。操作时应遵循以下原则，即苗足苗旺的适当早摘；泥脚深，有徒长现象的要烤重些，反之则轻些；保水不良的田块，不宜重摘。花芽分化期(6月中下旬-7月上旬)进行喷施叶面肥。