

# 陕西咸阳鲁丽苹果苗表现性好-九州红家庭农场

产品名称	陕西咸阳鲁丽苹果苗表现性好-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1.2厘米 苗木高度:1.3-2米 鲁丽苹果苗:1.5米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

## 产品详情

陕西咸阳鲁丽苹果苗表现性好-

九州红家庭农场鲁丽苹果苗整形修剪的基本任务可概括为以下三个方面：一是培养良好的树体结构，包括干的高矮、树体大小、骨干枝的数量和分枝角度等，以增加树冠中结实的有效容积和防止平面结果；不结果的骨干枝太多二是培养各类结果枝组，充分利用空间，做到多而不乱，密而不挤；三是平衡树势，调节生长与结果两者的关系，而枝组配置上主要问题是：外多内少、外强内弱，以及枝组过高、过大、过长，这样相互影响，扰乱树冠，恶化光照维持健壮的树体，为提早结果和丰产稳产奠定基础。鲁丽苹果苗苹果整形中采用的树形，乔化树一般多推广疏散分层形（也称主干疏层形），半矮化树和短枝型树多推广小冠疏层形和自由纺锤形。疏散分层形树形的结构特点是：于高50厘米~60厘米。整形完成后，全树有主枝5~6个，分两层排列（有时还有第三层）。还有一些果园外围枝条多而密，内堂光秃，结果外移层3个主枝邻接或邻近，相距在20厘米~40厘米以内，开张角60~70度。第二层2个主枝，伸展方位与层主枝相互插空错开，开张角比层主枝小，45~50度。影响枝组配备的因素较多，如骨干枝数量、角度、位置等、二层主枝间的距离（层间距）80厘米~100厘米。基部三主枝上各有副主枝（也称侧枝）2个，相互错开排列，第二层主枝上各有副主枝1个。全树高4米~5米。这种树形有明显的中心干，后期落头开心。不合理运用单轴延伸技术在纺锤形管理当中有个单轴延伸的管理方法，许多人在生产中，让主枝无限制的延伸，而不在一定程度加以调控，使主枝过长，致使枝头交接，若不加以处理，则会导致整形失败。如有第三层主枝，通常为临时性生枝，在落头时除去。主枝分层着生，上小下大，层间有较大的距离。它符合苹果的生长特性，成形较早，结构牢固，主枝能均匀占据较大的空间而通风透光良好。基部为层主枝，上部为第二层主枝，顶部树形完成后落头开心处。”当问及富贵树的叶片光亮度为什么这么高时，张老板神秘的笑笑说：“这可是我养花多年来积累的经验，一般是不会告诉别人的。”虽然这样说，张老板却顺手从桌子下面拿出一瓶啤酒。笑着告诉我：“啤酒对于观叶花卉来说真是好东西，你知道啤酒中含多种酸和一定的糖分，用它喷在花卉叶片上，不但可以保湿增绿，对促进花卉的生长也会有明显的效果。但要注意喷施啤酒液之前，要先把富贵树的叶片喷洗干净。等叶片上不再有水珠时，一份啤酒兑两份水，用喷雾器把叶片的正反面进行均匀喷施，这样喷出的叶片效果会出奇的好，不但增加了叶子的光亮度，提高了富贵树的观赏性，富贵树的销量也增加了不少。数字分别表示干高、层内距、层间距及主枝上副主枝距干8

的距离。整形要点是：基部三主枝可在两年内分期选留培养形成，并保持势力均衡；上层主枝不宜选留南向枝，以免影响光的透入。由于受传统“矮干”习惯的影响，以及许多果园建园是用了高度不够的三档苗，定干高度在50~70cm，导致多数果园主干高度只有30~40cm，不少果园主枝几乎接近地面。全树要保持明显的从属关系，即中心干的生长势要强于主枝，主枝要强于副主枝，上下层主枝要保持上小于下。中心干过强时可采用三叉枝转主换头，用第二枝代替原头延长生长，形成小弯曲，控制上强，同时增强层主枝生长势。当层主枝只能选留培养出2个时，也可在主枝基部选留适宜的“把门侧”代替第三主枝，一般情况下，4~5年才开始少量挂果，有的果园甚至5~8年才挂果形成“以侧代主”的形式，使树冠圆满。反之，如层生枝已形成4个而略显拥挤时，如某主枝缺乏副主枝（侧枝），也可采用“以主代侧”的剪法，将其中的五个主枝按隶属于某一主枝的侧枝的要求进行剪裁控制。主枝过粗过大，超过主干的二分之一；侧枝过大超过主枝的二分之一或三分之一；背上枝组过大，形成树上树；枝头枝组过大严重影响光照和扰乱树形。三主枝上的副主枝，要求在距主干分枝点60厘米~80厘米主枝背斜侧的方向选留培养，尽量不留“把门侧”，以免树冠内膛和下部枝条拥挤。对分枝角过小的主枝，应及早采用撑、拉等方法使之开张。用啤酒擦拭叶片。凡观叶花卉均可用脱脂棉或洁净的软布蘸啤酒，轻轻地擦拭叶片。擦拭时应注意不要用力过大，否则会损伤花卉，可用左手托起花卉叶片，右手进行擦拭，擦拭应从叶片尾部（叶尖）向上进行，一般先擦拭叶片正面，然后再擦拭叶片背面。另外，如果叶片实在太脏，先有清水给叶片洗个澡，待其出浴后，再按以上方法进行擦拭。擦拭后的花卉由于叶片能直接吸收营养物质，因此花卉的叶片更加翠绿，并富有光泽，同时叶片的质感也显得肥厚。

鲜花插花a)喜欢鲜花插花的朋友，为了挽留鲜花青春美丽的容颜，只要在花瓶中倒入1/3或1/4杯的啤酒，便能使插花的姿色更加光彩照人。一般情况下，可延长15—20天的观赏时间，更让人心醉的是从鲜花散发出的阵阵清香，给人以轻松、愉快的感受，让人心旷神怡。为什么用啤酒养花卉有如此良好的效果呢？1.啤酒中含有大量的化碳，而化碳又是各种植物及花卉进行新陈代谢不可缺少的物质2.啤酒中含有乙醇、这种物质不但能让花卉进行自由自在的呼吸，而且还能对花枝的切口进行消毒，因此也就具有防腐的作用，所以可使插花延长青春期。树木开始大量结果后（10~13年），树势稳定，此时可对原中心干落头开心，增加上部光照。主枝向外倾斜延伸时，根据具体情况可为直线延伸，也可为波状延伸，但不宜左右弯曲延伸。冬剪时的剪留长度，主枝一般为45厘米~60厘米，副主枝一般为40厘米~50厘米。结果枝由于多种原因难以形成，造成枝类构成不合理。骨干枝枝头间直保持1米左右的间距。小冠疏层形的树体结构基本上与疏散分层形相同，但树高、冠径和骨干枝级次均受到严格控制，树体更为紧凑。不结果的骨干枝太多一般干高30厘米~40厘米，树高2.5米~3米，冠径3.5米~4米，树冠呈扁圆形。层主枝开张角60~70度，其上各配置2个副主枝，枝距干约20厘米，往上相距20厘米在反方向再选配第二枝。利用弱小枝结果，是消极的、被动的，即使结果，也处于生长和营养的劣势部位；利用强壮枝转化成结果枝组，是积极的、主动的，结的果处于生长和营养的优势部位。所以去弱留强，利用强壮枝转化成结果枝组，是利用苹果树生长、营养的优势部位结果，这是多结果、结好果的基础。上面的主枝不留副主枝，其上直接着生结果枝组。入盛果期后中心干落头开心，控制树高和冠幅。自由纺锤形也是一种具有中心干的树形。中心干直立，其上均匀配置10~15个侧生枝，向四周伸展，无明显层次。最下部的3~5个侧生枝较长较强，相互保持8厘米~10厘米的间距，起骨干枝的作用。反而更加影响了光照。愈近中心干上部的侧生枝则愈短愈弱，只起结果基枝的作用。上下同方向侧生之间保持50厘米~60厘米的间隔。整个树冠只有一级分枝，并全部诱引呈70度~90度的开张角，上面培养中、小型枝组，或直接利用短果枝和短果枝群结果。矮化宽行密植栽培作为一个新的栽培理念越来越受到人们的重视。以前人们大都采用的是2×3或3×4的株行距，经过多年的实践，这种栽培方式的缺点已经显露出来，那就是果园郁闭，通风透光不良，工作不便，果实品质下降。于是，一些远见卓识之士借鉴欧洲果树管理经验，提出了矮化宽行密植栽培。达预定树高后，中心干落头开心，树冠呈宽圆锥形或纱锭形。矮化砧苹果树或苹果的短枝型品种均可选用这种树形。