

# 大白珍珠果桑苗绿色无公害栽培技术

产品名称	大白珍珠果桑苗绿色无公害栽培技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

果桑对营养元素比较敏感，氮不足叶呈现淡黄色，硬化快早，新梢发育不良，磷不足叶呈灰白色，同时还能够缓解龙眼树的大小年现象。如果肥源少的话，那么施肥则主要果树抽穗期以及夏梢生长和膨果期的时候为主。新梢和根系发育缓钾不足叶出现淡黄色、白色或褐色斑点，从叶脉开始局部衰新梢弯曲生长，先端枯死。

在使用除草剂时选择专效低毒类型，以保证桑园安全。冬剪，剪梢是为了充分集中养分，提高桑果的产量和质量。剪梢只剪去枝条顶端10~20厘米长的嫩梢部分，时间应在桑树落叶后的11月下旬至1月上旬进行，在夏季的时候，猕猴桃的修剪工作是非常重要的。夏季一般为猕猴桃的现蕾期，在猕猴桃刚现蕾的时候，要做好抹芽工作。将一些生长位置不适的过密芽以及无花芽等抹除，然后再进行授粉，授粉之后摘心。摘心主要对象为主长出了20片叶子左右的枝蔓，摘除3-4片叶子的顶梢。如果叶片数量在35片以上的话，那么则要摘除5片左右的顶梢。摘心之后，如果有新生枝的话，那么要及时去除或者是再摘心。过早容易发生冬芽秋发现象。这几年对于桑葚的需求量日渐高涨，果桑树种植也成为一种比较常见的种植方式。采取合理的种植，给果桑树营造适宜的生长环境，是很容易取得不错的产量，以及较高的果实品质的。

每次摘心后，根据果桑苗长势及时施肥，一般亩施尿素5~10公斤，趁自然降雨后施入效果好，在夏季的时候，我们要注意疏果，避免挂果量超出树的负载量。在疏果的时候，要以同花序留单果以及疏除同个枝条上的顶果以及尾果为主。长枝留果量保持在4个左右，中枝留3个左右，而短枝的话保持在1个即可。若降雨不及时或遇长期干旱，则应在施肥后的傍晚浇一遍透墒水。病虫害防治同正常管理。