

无刺花椒苗育苗地土壤选择

产品名称	无刺花椒苗育苗地土壤选择
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

天天用室温的水喷洒植株，使温室空气相对湿度坚持70~80%，温度25~28℃。经一个月摆布，假植的植株长出幼嫩芽梢。播种后该疏松的细沙1厘米，并盖草淋施保湿，幼苗出土后揭除高产，加强肥水管理和病虫害防治，当翌年春季幼苗生长到10-15厘米时移栽。在芽梢、嫩枝叶5厘米长，未纤维化以前及时采收。

果实膨大生长期喷施0.3%~0.5%尿素液和0.3%的磷酸二氢钾各1次，或喷施稀土微肥。花芽开始分化到果实采收前，喷施0.3%的磷酸二氢钾1次。果实采收后，喷0.5%的尿素液加0.5%的磷酸二氢钾1次。当砧木直径达0.5厘米时即可嫁接，嫁接可分为春季和秋季，嫁接方法有靠接、切接、劈接和补片芽接等。茄子靠接发在每年3-6月进行，但以清明前后成活率；切接和劈接在3-4月，从优良母株上的树冠上中部外围处生长充实老熟的当年生春梢或秋梢上取接穗，在砧木离地面15-20厘米嫁接。补片芽接发一般在夏秋季进行，在砧木主干约离地面30厘米处开芽接位，芽使用新肥料进行大面积喷施前，应先做试验，在确认其对叶片、果实及树体无危害时方可使用。花椒叶面追肥要特别注意肥料喷施浓度，高浓度易产生伤害。叶面喷施时间以早晚为好，避开中午高温时段。

对海拔的要求海拔高度不同，光、热、水、风、土壤条件等也会不同，对无刺花椒苗（嫁接无刺藤椒苗）种植地要选在平均气温20℃以上的地区，土壤要选在土质疏松、排灌良好的，是靠近水源，忌在粘重板结、干旱的土地上种植。定植主要是在3-4月或者9-10月，以苗木老熟为宜，种植密度更加经营方式的生长发育会产生不同的影响。如果灌溉条件尚可还好，但不少花椒是种在水源条件欠缺的丘区。