

云南大理1公分鲁丽苹果苗丰产性强-九州红家庭农场

产品名称	云南大理1公分鲁丽苹果苗丰产性强-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1.2厘米 苗木高度:1.3-2米 鲁丽苹果苗:1.5米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

云南大理1公分鲁丽苹果苗丰产性强-九州红家庭农场当前苹果栽培中，密植栽培已成主要趋势，1公分鲁丽苹果苗密植栽培也是缩短生产周期、提高产量和品质的重要手段。在苹果高密栽培中，树形选择和修剪用法是很关键的问题。在密植栽培中，目前国外运用较多的树形主要有细长纺锤形、纵轴形和超细纺锤形等。1公分鲁丽苹果苗细长纺锤形适合于树高1.8-2.4米，每亩栽115-247株，因矮化砧木固着性差及整形本身的需要，整形过程中需设支柱。生产当中还应该考虑果品生产目标等其他因素，确定合理的枝量定植时选用有分枝的大苗，定植后头几年很少修剪，否则会刺激生长而延缓结果。回缩多而重为了开张骨干枝角度，常用背后枝换头，多数情况下，其开张角度的效果不好。为了缩短主枝或枝轴，不分枝势强行回缩，造成枝条缩后反旺，缩而不回。对于枝组处理，多数人喜欢采用花上剪或齐花剪，以提高坐果率。强旺的主枝疏掉，留者弯倒削弱长势促花。当第三或第四年树体开始交接时，要有选择地疏枝。疏枝时基部留2-3厘米的短桩，利用下部瘿芽或隐芽促发弱枝，将来成为结果枝。

在大冠稀植向小冠密植栽培转化过程中，因整形修剪不当，使树形结构普遍出现了问题。树枝达到预定大小后，通过回缩修剪手法维持树冠和使树体保持圆锥形。冬剪原则中干上着生的主枝，粗度要小于中干粗的1/2，中干不短截。看果实榉树、朴树、珊瑚朴为核果；榆树、榔榆、青檀为翅果。榉树核果几乎无梗，淡绿色，上面偏斜，有凹陷；朴树核果黄色或橙红色，果小，果柄与叶柄近等长；珊瑚朴核果橙红色。榉树的果实近无柄，绿色，不易发现。朴树的果实圆形橙黄色，果小珊瑚朴的果实橙黄色至橙红色，果较大榆树翅果近圆形，果较大，无毛，春季花后结果，所谓的榆钱饭吃的就是它的嫩果，形似铜钱；榔榆9月花果，翅果椭圆形或卵状椭圆形，翅果较小，有毛；青檀翅果近圆形或近正方形，较小，稍带木质，无毛或稍有毛。及时疏掉密挤枝和进行老枝更新，保持良好的通风透光条件。侧生分枝上不留直径大于其直径1/2的分枝。疏除下部小枝，壮枝回缩到弱的下垂枝处。平面结果，无法完成树形短枝及时更新，防止结果部位外移。这么庞大繁杂的结构级次就必然造成：成型时间长进入盛果期后限制树体高度，维持树体上下平衡，内外结果。1公分鲁丽苹果苗纵轴形适用于亩栽82-148株。整形时需设支架，一般用5条等距离的水平铁丝加上支柱做成，或者每株用两条水平铁丝加一根垂直木棍或竹竿，木棍绑于铁丝上。不适当的刻芽、扭梢和过多的摘心造枝条密集

。不分树势强弱及树体的主从关系，盲目的环割环剥，加剧了树体结构上的矛盾。整形修剪不适合品种砧木特性和立地条件不同的品种、不同的砧木、不同的立地条件，在修剪方法上应有所不同，红富士萌芽率弱、成枝力强、不易成花、结果后易早衰；矮化红富士容易成花但树势弱时容易歪干；短枝型元帅系苹果容易成花，但枝条生长量较小，夹角小，树不开张；秦冠、嘎拉等又是另外的特性，各不相同，整形修剪上就要充分考虑这些特点，选择适应品种砧木特性的修剪方法这样才能取得事半功倍的效果。整形完毕全树高3米左右。修剪原则为能早期丰产，前期很少修剪。定植用独干苗时，植后定干；用分枝苗则不需定干。中干不短截，有时疏掉强中干而换成弱中干时也不短截。这样既利于早结果、控制树势，又限制了树体高度。

纵轴形中干较弱，分枝稀疏，需将其绑到铁丝或支柱上以防折断。不分树势盲目修剪，整形修剪上没有做到促控结合整形修剪要根据树势灵活的进行，做到促控结合，该促的促，该控的控，生产中过分运用短截等促势手法的较多，往往造成果树旺长，大量冒条，枝条交接，难以稳定成花，当然也有过分运用控制手段，到处刻芽、转枝、拉枝，造成树体遍体鳞伤，大量形成弱花芽，结的果子小，树势衰弱，病虫害严重。同时夏季通过对前部第三、四个侧枝摘心来促进分枝。

密植苹果园密度越大，要求角度越开张次侧枝摘心在枝条长5-10厘米时进行，可间隔两周再次摘心，促进分枝。定植后2-3年每年都要摘心季摘心做得好则冬剪时仅去掉旺枝和下部冗枝。挑选花卉修饰心情阳台本就是一个享受自然阳光和呼吸新鲜空气的绝妙场所，天然的阳光还具有较强的杀菌作用。阳台健康的原则就是保持良好的通风和采光。笔者在花卉市场咨询了相关人士，一般比较常见的花有夹竹桃、绣球花、杜鹃花、黄蝉、紫藤、三角梅、龙吐珠、金盏菊、蝴蝶花、雏菊、瓜叶菊、石竹、长寿花、矮牵牛、一串红、美人樱、金鱼草、大波斯菊、万寿菊、康乃馨、非洲菊、千日莲、大丽花、紫罗兰等。对2-3年生的分枝回缩到基部花芽或弱枝上；使结果部位靠近中干。第三、四年出现遮荫时，需疏枝透光，首先分1-2年疏掉下层分枝，余下4-5个分枝永久保留。冬剪疏枝时保留足够的结果枝，有利于控制中干的长势。与细长纺锤形一样，维持树体大小也靠回缩更新。行间通过回缩及更新维持圆锥形树冠，行内的树形则不重要，形成树墙。对于纵轴形的树来说，控制中干要有耐心，如果修剪过早，会促使中干旺长形成“树上长树”。

许多密植果园，仍然采用大冠树形，果园密闭是必然的需等到到早期的产量足能树势时开始修剪。一般4-6年进入大量结果期时再修剪。此时树体可能已高于顶层铁丝1.2-1.5米，要落头至接近顶层铁丝的部位，宜从2-3年生枝段剪截。