

黑桃苗的丰产栽培技术及销售价格及单价

产品名称	黑桃苗的丰产栽培技术及销售价格及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:黑桃苗 规格:150 基地:创隆园艺场
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

一、建园黑桃栽培的适宜株行距 $3\text{m} \times 2\text{m}$ ，定植苗木采用成品苗和芽苗均可，定植前挖深60cm的定植坑，将有机肥与表土混合回填，栽植时根颈与地面持平，边栽边踏实土壤，然后灌透水。

二、合理整形：黑桃喜光，干性较强，顶端优势强，整形时可根据栽植密度分别选择，亩栽110株，采用自由仿锤形，其成枝力强，所以对一般枝条应疏不截，并采取拉或支的手法，使其尽量和主干保持 $70 \sim 90$ 度角，主枝上不留侧枝，直接着生中小型结果枝组。随着树龄增加和树势的稳定，应及时落头平心，以改善内膛光照条件，三主枝自然开心形的特点是：光照条件好，干高 $40 \sim 50\text{cm}$ ，树高 $3 \sim 3.5\text{m}$ ，冠径 $2.5 \sim 3\text{m}$ 。三主枝以 $15 \sim 20\text{cm}$ 的间隔距离错落着生，第一主枝与主干的夹角为 $60 \sim 70$ 度，第二主枝 $50 \sim 60$ 度，第三主枝 $45 \sim 60$ 度，每个主枝只配 $1 \sim 2$ 个背斜侧枝。主侧枝中部排列大、中型结果枝组，内侧与梢部着生小型结果枝组。

1、定植当年应力争多发新梢，于5月下旬至6月上旬当新梢60mm左右时，进行摘心，促发副梢增加结果枝，以后各月可通过拿枝、扭梢摘心和疏枝进行整形，冬季基本不动剪。一般在定植后第二年便成形。

2、盛果期修剪的主要任务是养健壮的结果枝组，使其紧靠主干，分布均匀，保证行间通风透光。此期新梢数已基本够用，生长期修剪主要是疏枝和扭枝，不让直立枝生长，枝组以单枝更新为主，少数在冬季可短截更新。

三、花果管理：黑桃芽苗定植一般2年即开始结果，3年后进入盛果期，花芽形成容易，结果率较高，大大超过负载量，必须进行轻度的疏花疏果，但有些年份由于花期雨雪，引起病害或霜冻，造成落果而影响果实产量。

防害保果措施有：

1、建园时注意配置好授粉树。

2、加强果园综合管理，促进提高树体储藏养分水平，花器正常发育。幼苗树少施氮肥，增施磷钾肥；实

行以夏剪为主，冬剪为副的方法，减少树冠阴闭，改善光照条件。

3、对花量大的树，花前追肥，灌水或花后叶面喷施0.3%尿素，夏剪时剪除过弱、过密花枝，留下的花要进行疏蕾疏花。

4、盛花期喷0.1%的硼酸液或花期喷10~20毫克/千克的防落素，能减少落果。

5、黑桃主要病虫害有：白粉虱、红蜘蛛、蚜虫、介壳虫。

病害有流胶病和白粉病。

6、花芽萌芽到至莺期，喷布波美3~5度石硫合剂杀菌、杀卵、杀介壳虫。

7、收麦前喷布50%敌敌畏1000~1500倍液1~2次，毒杀白粉虱，可加50%多菌灵可温性粉剂防治果实病害。

8、7月份干旱时注意：白粉病、蚜虫和红蜘蛛的防治；可喷布50%，甲基托布津600~800倍液绿素，功夫3000~4000倍液。