

# 花椒苗出售基地，一年花椒苗出售价格及单价

产品名称	花椒苗出售基地，一年花椒苗出售价格及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	.50/棵
规格参数	品种:花椒 规格:0.5 高度:150
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

## 产品详情

我国花椒害虫种类很多，已知的约有132种。如金龟子类、花椒跳甲、花椒凤蝶、花椒刺蛾、大袋蛾、黑蚱、花椒蚜虫、花椒介壳虫、花椒红蜘蛛、花椒瘿蚊、花椒虎天牛等等。

### 1、花椒虎天牛

【形态特征】成虫体长19~24毫米，体黑色，全身有黄色绒毛。头部细点刻密布，触角11节，约为体长的1/3。足与体色相同。在鞘翅中部有2个黑斑，在翅面1/3处有 - 近圆形黑斑。卵长椭圆形，长1毫米，宽0.5公分，初产时白色，孵化前黄褐色。初孵幼虫头淡黄色，体乳白色，2-3龄后头黄褐色，大龄幼虫体黄白色，节间青白色。蛹初期乳白色，后渐变为黄色。

#### 【防治方法】

清除虫源：及时收集当年枯萎死亡植株，集中烧毁。

人工捕杀：在7月的晴天早晨和下午进行人工捕捉成虫。

生物防治：川硬皮肿腿蜂是花椒虎天牛的天敌，在7月的晴天，按每受害株投放5~10头川硬皮肿腿蜂的标准，将该天敌放于受害植株上。实践证明，应用川硬皮肿腿蜂防治花椒虎天牛效果好。

### 2、花椒介壳虫

花椒介壳虫是同翅目蚧总科为害花椒的蚧类统称，有草履蚧、桑盾蚧、杨白片盾蚧、梨园盾蚧等。它们的特点都是依靠其特有的刺吸性器，吸食植物芽、叶、嫩枝的汁液。造成枯梢、黄叶，树势衰弱，严重时死亡。

【防治方法】由于蚧类成虫体表覆盖蜡质或介壳，药剂难以渗入，防治效果不佳。因此，蚧类防治重点在若虫期。

物理防治：冬、春用草把或刷子抹杀主干或枝条上越冬的雌虫和茧内雄蛹。

化学防治：可选择内吸性杀虫剂，如氧化乐果1000倍。尤以40%速扑杀800~1000倍效果好。

生物防治。介壳虫自然界有很多天敌，如一些寄生蜂、瓢虫、草蛉等。

### 3、花椒红蜘蛛（山楂叶螨、山楂红蜘蛛）

- 年发生6-9代，以受精雌成虫越冬。在花椒发芽时开始危害。第-代幼虫在花序伸长期开始出现，盛花期危害盛。交配后产卵于叶背主脉两侧。花椒红蜘蛛也可孤雌生殖，其后代为雄虫。每年发生的轻重与该地区的温湿度有很大的关系，高温干旱有利于发生。

化学防治：必须抓住关键时期，在4~5月，害螨盛孵期、高发期用25%杀螨净500倍液、73%克螨特3000倍液防治。或用内吸性杀虫剂氧化乐果1000倍。40%速扑杀800~1000倍。

生物防治：害螨有很多天敌，如一些捕食螨类、瓢虫等，田间尽量少用广谱性杀虫剂，以保护天敌。

### 4、花椒瘿蚊

花椒瘿蚊又名椒干瘿蚊。可使受害的嫩枝因受刺激引起组织增生，形成柱状虫瘿，使受害枝生长受阻，后期枯干，而且常致使树势衰老而死亡。

剪去虫害枝，并在修剪应及时涂抹愈伤防腐膜保护伤，防治病菌侵入，及时收集病虫枝烧掉或深埋，配合在树体上涂抹护树将军阻碍病菌着落于树体繁衍，以减少病菌成活的率。

肥水充足，铲除杂草，在花椒花蕾期、幼果期、果实膨大期各喷酒一次花椒壮蒂灵，提高花椒树抗病能力，同时可使花椒椒皮厚、椒果壮、色泽艳、天然品味香浓。

药剂防治。在花椒采收后及时喷酒针对性药剂加新高脂膜增强药效，防治气传性病菌的侵入，并用棉花蘸药剂在颧瘤上点搽，全园喷酒护树将军进行消毒。