

## 江苏盐城鲁丽苹果树苗产量高-九州红家庭农场

产品名称	江苏盐城鲁丽苹果树苗产量高-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1.2厘米 苗木高度:1.3-2米 鲁丽苹果苗:1.5米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

### 产品详情

江苏盐城鲁丽苹果树苗产量高-九州红家庭农场鲁丽苹果树苗修剪分冬季修剪（休眠期修剪）和夏季修剪（生长期修剪）两类、冬季修剪的基本方法有短截、回缩和疏枝，有时把长放不剪也放在广义的修剪方法中。树形复杂，不易掌握短截又可分轻截、中截和重截等几种不同的程度，从而其修剪反应也不同。对枝条轻短截或长放，有利于缓和枝势、树势。对枝条中截、重截或回缩，有利于促进枝芽生长和枝组、骨干枝的更新复壮。疏枝可减少分枝，改善光照，并有抑前促后的作用，有利于花芽的形成。夏季修剪包括摘心、抹芽、疏梢、扭10梢、拿枝、拉枝、环剥等基本方法。传统的大树形、多主多侧、多级次，树体60%以上的营养用在生长新梢、枝干，只有少数营养用于结果，且冠内外矛盾较多，难以调控，不便管理，树冠内膛光照差，冠内冠外果实质量差异也大。果树管理是五级结构：主干 - 主枝 - 侧枝 - 结果枝组 - 结果枝。一般来说，夏季修剪对树体生长有一定的作用，能缓和枝势和树势，常有利于花芽的形成，在幼旺树上应用较多。鲁丽苹果树苗苹果幼树期的修剪以选留培养骨干枝为主，同时掌握轻剪多留辅养枝，增加枝叶量，使地上部和根系的生长早趋平衡，促进成花结果。苗木栽植后，按不同树形要求对苗木进行短截，称为定干。“我之所以看好这个树种，与当前形势是有关的。目前，国家倡导园林树木多样化，而且倡导大量应用乡土树种。榆树作为北方地区重要的乡土树种，肯定是有大发展的。同时，我们还应该注意到，榆树的品种也比较多，同样需要多样化，故而，我选择了“霸王鞭”。我选择它，是多年观察后才下的决心。”张夫寅说，他已经在小范围内应用了一些“霸王鞭”，反应都不错。“下一步，我要做好两样工作。一是大量培育工程苗，品种好，没有量是不行的。定干时剪口下要求有5~7个以上的饱满芽，20厘米~25厘米称为整形带。这些芽前发成枝后，从中选留中心干的延长枝及层主枝或较粗壮的侧生枝。每年冬季按整形要求剪截培养中心干和各级骨干枝枝头，注意剪口芽的质量和留芽方向。影响枝组配备的因素较多，如骨干枝数量、角度、位置等位于中心于层间和主枝下部的生长枝，除过密的需疏除外，其余枝条应适当多加保留，作为辅养枝，并采用轻剪长放拉平的方法，使其能辅养树体，缓和树势及早期结果。整形带以下定干当年不扶芽，有利于主干的加速和根系的生长，发出的枝条中近地面的和拥挤的可除，其余可控制或甩放。在培养骨干、利用辅养枝的同时，在主枝、副主枝的背后、两侧及背上应及时分别培养大、中、小各类枝组，使稳定结果。不合理运用单轴延伸技术在纺锤形管理当中有个单轴延伸的管理方法，许多人在生产中，让主枝无限制的延伸，而不在一定程度加以调控，

使主枝过长，致使枝头交接，若不加以处理，则会导致整形失败。枝组在树冠内的配置做到上稀下密，内外稀中间密。初果期多培养两侧及背后的平斜枝组，盛果期后要适当多利用背上的直立枝组，以维持枝组的生长势。树体超高，落头不及时或落头过急一般来说，果树高度不能超过行距，生产中许多果园存在树体偏高的问题，有的按照主干疏层形整形，却没有做到延迟落头开心采用自由纺锤形树形的植株，不必培养大型枝组。鲁丽苹果树苗夏季修剪是缓和幼旺树长势，促进花芽分化和早期丰产的一项重要措施，要充分加以应用。

旺长辅养枝在春梢停长后和秋梢开始生长时，可进行拿枝，使枝条的木质部伤而不断，从而改变角度、方向和生长势。生产当中还应该考虑果品生产目标等其他因素，确定合理的枝量旺长无花或少花的幼树还可采用春刻伤、夏环剥和秋拉枝的方法，

促使成花。还有一些果园外围枝条多而密，内堂光秃，结果外移

春刻伤是指春季萌芽前在辅养枝或侧生枝两侧及背后的芽上方进行刻伤，促使多萌芽；一般春季萌芽前去除弱枝，剪掉生长过长的枝或者短截，可以促进新枝萌发，增强树势。对于刚移栽的苗木，移栽之前剪掉二分之一的枝和叶，只保留主干部分，一方面是为了减少蒸腾作用，提高新环境的适应能力，另一方面是为了加快移栽苗生根发芽速度。冬剪刚进入冬季，火焰木基本停止生长，来到休眠期，此时修剪主要是疏枝疏叶，清除病虫枝，增加透光性，隔绝病源，剪除不必要的枝干，控制好各主、侧枝的层次，尽量保留已分化的顶芽，增加越冬抗寒能力。夏环剥是在5月下旬到6

月上旬在主干上方或主枝、辅养枝的基部进行环剥或环割3~4圈，使在环剥口上万多积累养分，促进成花；秋拉枝是在秋梢停长前后拉大枝条的开张角度，有利于缓和枝势。一般情况下，4~5年才开始少量挂果，有的果园甚至5~8年才挂果自由纺锤形树形侧生枝的诱引也多在这一时期中进行。

秋梢停长后20天左右，对辅养枝采用剪梢和回缩内膜枝组，也可减缓幼旺树的长势，并使小枝复壮。鲁丽苹果树苗进入盛果期后，当逐步转入以枝组结果为主时，对多年生长的辅养枝要逐年清理、回缩和改造。有的果树相邻的两个主枝碰头后共同向上生长，严重的高过树头，整个树如同包心白菜一样特别是树冠郁闭的，要逐年落头开心和打开层间，使光透入内膛。为稳定结果防止大小年，修剪过重或过轻在生产中，整形修剪的轻重把握不好就容易走向两个极端。由于受传统大冠稀植修剪技术的影响，过于强调整形，短截修剪过多过重，使树体长势强旺，而冠体过大。冬剪时要控制和保持一定的花芽和叶芽的比例达1:2~4。花芽过多之年，可采取疏芽、短截、回缩和破顶，并配合疏花疏果，不使结果过量，从而促进发枝。花芽较少之年，则尽量多保留花芽结果。枝组配备不合理在一株树上，除了各级骨干枝外，就是各类枝组，而枝组配置合理与否，直接关系到树冠的通风透光效果对结果枝组要不断更新复壮，疏弱留壮，细致更新，保持结果能力。总之，

通过修剪要使结果枝与营养枝之间保持一定的比例。大体使每年结果枝的数量不超过总枝数的30%~40%。树冠直立、封闭、不均衡，树势偏旺，大枝多，主从关系不明；外围枝密集，内堂枝细弱，营养枝和结果枝比例失调；树冠内堂光照不良，与生产优质果的要求相差甚远当株间外围枝头开始交接，对延长枝原则上不再短截，可缩编放放，始终保持有一个生长势较强的带头枝。

当树体渐趋衰老，外围新梢生长量在30厘米以下时，

我国苹果目前应用最多的树形是小冠疏层形、自由纺锤形和细长纺锤形或介于它们之间的多种小冠类型要及时回缩骨干枝到2~4年生部位的分枝处，促进树冠较大的更新复壮。