山东日照一刀乔化鲁丽苹果树苗丰产性强-九州红家庭农场

产品名称	山东日照一刀乔化鲁丽苹果树苗丰产性强- 九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1.2厘米 苗木高度:1.3-2米 鲁丽苹果苗:1.5米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

山东日照一刀乔化鲁丽苹果树苗丰产性强-
九州红家庭农场一刀乔化鲁丽苹果树苗 整形修剪的基本任务可概括为以下三个方面：
一是培养良好的树体结构， 包括干的高矮、 树体大小、 骨干枝的数量和分枝角度等，
以增加树冠中结实的有效容积和防止平面结果； 主枝过粗过大，超过主干的二分之一；侧枝过大超过主枝的二分之一或三分之一；背上枝组过大，形成树上树；枝头枝组过大严重影响光照和扰乱树形
二是培养各类结果枝组， 充分利用空间， 做到多而不乱， 密而不挤； 三是平衡树势，
调节生长与结果两者的关系， 下部主枝过长，相邻的两棵树枝头交错，有的甚至延伸到另一棵树的内膛，果园早早的封了行，整体密不透风，光照差，施肥、打药、采果等工作难以进行维持健壮的树体，
为提早结果和丰产稳产奠定基础。 一刀乔化鲁丽苹果树苗苹果整形中采用的树形，
乔化树一般多推广疏散分层形（也称主干疏层形），
半矮化树和短枝型树多推广小冠疏层形和自由纺锤形。 疏散分层形树形的结构特点是： 于高 50 厘米～60 厘米。 整形完成后， 全树有主枝 5～6 个， 分两层排列（有时还有第三层）。
不结果的骨干枝太多层 3 个主枝邻接或邻近， 相距在 20 厘米～40 厘米以内， 开张角 60～70 度。 第二层 2 个主枝， 伸展方位与层主枝相互插空错开， 开张角比层主枝小， 45～50 度。 树冠直立、封闭、不均衡，树势偏旺，大枝多，主从关系不明；外围枝密集，内堂枝细弱，营养枝和结果技比例失调；树冠内堂光照不良，与生产优质果的要求相差甚远、 二层主枝间的距离（层间距） 80 厘米～100 厘米。
基部三主枝上各有副主枝（也称侧枝） 2个， 相互错开排列， 第二层主枝上各有副主枝 1 个。 全树高 4 米～5 米。 这种树形有明显的中心干， 后期落头开心。 没有根据树龄特性进行修剪幼树期，以快速培养树形为目的，管理上多采用短截等方法，增加分枝；盛果期以调节为主，通过适当修剪调节树体平衡、光照分布、树势的强弱等；衰老期则是尽量集中营养，采用更新、回缩复壮等方法延长结果年限。如有第三层主枝， 通常为临时性生枝， 在落头时除去。 主枝分层着生， 上小下大， 层间有较大的距离。
它符合苹果的生长特性， 成形较早，
结构牢固，主枝能均匀占据较大的空间而通风透光良好。基部为层主枝， 上部为第二层主枝， 顶部树形完成后落头开心处。山茶花原产。喜温暖、湿润和半阴环境。怕高温，忌烈日。山茶花的生长适温为18～25°C，3～9月为13～18°C，9月至翌年3月为10～13°C。当温度在12°C以上开始萌芽，30°C以上则停止生长，始花温度为2°C，适宜花朵开放的温度在10～20°C。山茶花的耐寒品种能短时间耐－10°C，一般品种

－3--－4℃。夏季温度超过35℃，就会出现叶片灼伤现象。山茶花适宜水分充足、空气湿润环境，忌干燥。高温干旱的夏秋季，应及时浇水或喷水，空气相对湿度以70％～80％为好。 数字分别表示干高、层内距、 层间距及主枝上副主枝距干 8 的距离。整形要点是：
基部三主枝可在两年内分期选留培养形成， 并保持势力均衡； 上层主枝不宜选留南向枝，
以免影响光的透入。
许多密植果园，仍然采用大冠树形，果园密闭是必然的全树要保持明显的从属关系，
即中心干的生长势要强于主枝， 主技要强于副主枝， 上下层主枝要保持上小于大。
中心干过强时可采用三叉枝转主换头， 用第二枝代替原头延长生长， 形成小弯曲， 控制上强，
同时增强层主枝生长势。 当层主枝只能选留培养出 2 个时， 也可在主枝基部远留适宜的“ 把门测 ”
代替第三主枝， 许多密植果园，仍然采用大冠树形，果园密闭是必然的形成“ 以侧代主 ”的形式，
使树冠圆满。 反之， 如层生枝已形成 4 个而略显拥挤时， 如某主枝缺乏副主枝（侧枝），
也可采用“ 以主代测 ”的剪法， 将其中的五个主枝按隶属于某一主枝的侧枝的要求进行剪截控制。
另外一些果园有下大上小问题，下部主枝多而轮生，形成卡脖子现象，干细弱三主枝上的副主枝，
要求在距主干分枝点 60 厘米～80 厘米主枝背斜侧的方向远留培养，
尽量不留“ 把门侧“ 以免树冠内膛和下部枝条拥挤。 对分枝角过小的主枝， 应及早采用撑、 拉等方法
使之开张。万年青喜温暖、湿润及半阴。盆栽夏季放在室内距朝南窗台8厘米左右处或放在室外有遮荫的地方，避免强光直晒，否则叶片易下垂。除充足浇水外，每天早晚应向花盆周围地面上洒水，以利造成湿润的小气候。生长期间，浇水不可过多，当盆土表面发白时则是浇水的适期。在春秋季节，每隔3～4周施一次腐熟饼肥水，这样可使花叶万年青生长健壮，叶片青绿。每隔半个月施一次液肥。北方冬季入室后，室温不可低于12℃。 树体开始大量结果后（10～13 年）， 树势稳定，
此时可对原中心于落头开心， 增加上部光照。主枝向外倾斜延伸时，
根据具体情况可为直线延伸，也可为波状延伸， 但不宜左右弯曲延伸。 冬剪时的剪留长度，
主枝一般为 45 厘米～60 厘米， 副主枝一般为 40 厘米～50
厘米。枝量过多，光照差，无用寄生枝多，果品质量差；枝量太少，产量难以提高，果子容易日烧
骨干枝枝头间直保持 1 米左右的间距。 小冠疏层形的树体结构基本上与疏散分层形相同， 但树高、
冠径和骨干枝级次均受到严格控制， 树体更为紧凑。 级次过多许多果树级次太多，传统的果树管理是五级结构：主干－主枝－侧枝－结果枝组－结果枝一般干高 30 厘米～40 厘米， 树高 2.5 米～3 米， 冠径 3.5米～4 米， 树冠呈扁圆形。 层主枝开张角 60～70 度， 其上各配置 2 个副主枝， 枝距干约 20 厘米，
往上相距 20 厘米在反方向再选配第二枝。 利用弱小枝结果，是消极的、被动的，即使结果，也处于生长和营养的劣势部位；利用强旺枝转化成结果枝组，是积极的、主动的，结的果处于生长和营养的优势部位。所以去弱留强，利用强旺枝转化成结果枝组，是利用苹果树生长、营养的优势部位结果，这是多结果、结好果的基础。上面的主枝不留副主枝， 其上直接着生结果枝组。 入盛果期后中心干落头开心，
控制树高和冠幅。自由纺锤形也是一种具有中心干的树形。 中心于直立， 其上均匀配置 10～15
个侧生枝， 向四周伸展， 无明显层次。 最下部的 3～5 个侧生枝较长较强，相互保持 8 厘米～10
厘米的间距， 起骨干枝的作用。
在大冠稀植向小冠密植栽培转化过程中，因整形修剪不当，使树形结构普遍出现了问题
愈近中心干上部的侧生枝则愈短愈弱， 只起结果基枝的作用。 上下同方向侧生之间保持 50 厘米～60
厘米的间隔。 整个树冠只有一级分枝， 并全部诱引呈 70 度～90 度的开张角， 上面培养中、 小型枝组，
或直接利用短果枝和短果枝群结果。所谓矮化宽行密植栽培，一般来说，要求行距比株距大2m以上，一般采用1×3、2×4和1.5×4的栽培方式，树形选用主干形或高纺锤形，选用矮化苗或短枝型，经过矮化栽培，树体高度控制在2.5m左右。 达预定树高后， 中心干落头开心， 树冠呈宽圆锥形或纱锭形。
矮化砧苹果树或苹果的短枝型品种均可选用这种树形。