

金桂(八月桂)桂花树种子

产品名称	金桂(八月桂)桂花树种子
公司名称	南宁市富荣达贸易有限公司
价格	60.00/千克
规格参数	发芽率:98 (%) 品种纯度:100 (%) 颜色:棕色
公司地址	南宁市科德西路9号金乐福花园3号楼2单元204号房
联系电话	13077712203 013077712203

产品详情

发芽率	98 (%)	品种纯度	100 (%)
颜色	棕色	学名	桂花种
生长适温	是	科属	树木
株高	0 (公分)	直径	0 (mm)
新奇创意项目	不报名		

桂花树的播种育苗是指通过有性过程得到桂花树种子，利用桂花树种子来繁殖后代的一种育苗方法。该方法在园林绿化树种育苗中常用。其操作简便，能获得大量的桂花实生苗，而且苗木生长健壮，根系发达，生命力强，寿命长，尤其是树干发育良好，适宜用作行道树或庭院树。种实的采集和保存桂花的果实为核果，外面包裹肉质果皮，种子在翌年月份成熟。当果实进入成熟期，果皮由绿色逐渐转为紫黑色，并开始从树上脱落时，即可从树上或地面收集饱满的种实。桂花的果实成熟脱落时，外部形态上虽已完全成熟，但内部种胚发育尚不完全，生理上还没有完全成熟，需要经历长达6个月以上的时间，才能完全生理后熟。因此，种实采集处理后，不宜随采随播，而要及时进行混沙贮藏，使种子顺利度过生理后熟期。将采集的果实堆沤3天左右，待果皮软化后，浸水搓洗去果皮和果肉，并漂浮去空瘪的种粒，得出净种，稍加晾干，即混润沙贮藏。沙藏时，要控制好沙子的湿度，初期要求沙层偏干而不宜过湿，沙的持水量以10为宜；到了沙藏的中、后期，可逐步加大沙的持水量至5000，一般以“手握成团，手松即散”的湿度较为适宜。沙藏期间，要注意防止鼠害。还要注意勤查种子，如发现种子发霉，则应及时捞出，用清水洗净、阴干后，重新混沙贮藏。种子忌暴晒，由于桂花种子种皮上没有蜡层，很容易因失水而干瘪，使种子失去生理活性，从而影响发芽。2、月种桂花的播种以当年的11-12月份或次年1^2月份进行为宜。多采用条播法。在桂林地区通常采用宽幅条播，即在准备好的苗床上，开横向的条沟，沟宽10^12厘米，沟深2-3厘米，沟距20^25厘米。然后在沟中间，每隔6-8厘米播一粒种子。播种时，要将种脐侧放，以免胚根和幼茎弯曲，影响将来幼苗的生长。一覆细土1^2厘米厚，再盖上薄层稻草，喷水至土壤湿透，以防土壤板结和减少水分蒸发。70y. ~ 80写，从一般母树采集的种子，发芽率为50%左右。40左右。每天的遮阳操作一般是上午盖，傍晚揭；晴天盖，阴雨天揭。到9月中旬，可以不用再遮阳。桂花种子的发芽期不整齐，盛期不明显，前后可持续4个月。催芽较好的从健壮母树所采集的种子，发芽率可达3、护播种后管理工作的好坏，是育苗成败的关键。种子萌发后的管理工作应及时跟上，以利于幼苗生长。(1)、揭草和遗阅当种子萌发出土后，要及时揭除盖草，将草放置于行间。这样既可保持土壤湿润

，又能防止杂草生长。桂花幼苗比较耐阴。进入夏季高温季节后，应及时搭棚遮阳，保持荫棚的透光度为(2)、松土和除草松土要及时进行，深度为2-3厘米。一般宜浅不宜深，以防伤根。除草可结合松土进行，以人工除草为主，力求做到除早、除小和除了。沟边、步道和田埂的杂草也要除净，以清洁圃地，消灭病虫害滋生场所。(3)、浇水和施肥夏秋干旱季节，必须注意抗旱保苗。浇水以早晨或傍晚进行为宜，水要浇透浇匀。雨季要加强清沟排渍，避免苗木受涝。幼苗出土1个月以后，进入苗木生长旺盛时期。此时施肥以薄肥勤施为原则。每月应浇施1-2次腐熟稀薄的厩肥液或氮肥。浓度以厩肥液10%或尿素液30%为宜。随着幼苗的生长，施肥浓度可以适当加大。入秋后，停止追肥，以防苗木徒长和遭受冻害。在追肥时，不要使肥液沾污幼苗，以免伤苗。(4)、病虫害防治连作的桂花苗圃容易发生叶枯病和立枯病，造成叶片大量枯黄脱落，或苗木根颈和根部皮层腐烂，而导致全株枯死。因此，桂花圃地不宜选择连作地，也不宜选择种过烟草、麻类和蔬菜等作物，容易发生菌核性立枯病和根腐病的地区。如发生病害应及早喷波尔多液防治。桂花幼苗期还容易发生蚜虫危害，应及时防治。

4、幼苗移植一般1年生苗高25-30厘米，次年早春进行间苗，去掉弱苗和病苗，保留健康幼苗，使株行距为25厘米x25厘米2年生苗高60-80厘米，3年生苗高120-150厘米，即可进行再次移植。广西特产,正宗八月桂,联系人:黄经理,电话:18877137