金太阳杏树订购价格,金太阳杏树批发基地及单价

产品名称	金太阳杏树订购价格,金太阳杏树批发基地及单价
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:金太阳杏树 规格:1公分 基地:创隆苗木基地
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

烂果原因棚室内光照不足长时间遇阴天或雨、雪天,棚膜表面灰尘多,致使温室内光照不足,湿度过大。幼果长时间生长在阴暗潮湿的空气中,容易造成烂果。棚室内温度过高在杏幼果期,如果棚室内温度超过摄氏28度,棚膜水滴就会直接滴在幼果表面,引起烂果。保护不及时,造成烂果由于人们错误地认为,杏树在棚室条件下栽培,没有风雨、昆虫等传播病菌,不会发病,因而不喷或少喷杀菌剂,致使杏疮和病菌滋生,导致烂果。幼果表面有附着物由于温室通风条件差,湿度过大,杏花谢后,许多花瓣不凋落,而直接附着于幼果表面。随着幼果的生长发育,这些花瓣遇潮湿吸水,而与花瓣接触的部位,长时间处于霉湿状态,使果实腐烂。预防对策针对棚室杏烂果现象,提出以下对策,供果农朋友们参考。改善光照条件,调节控制温、湿度选用优质无滴膜,如果是用旧的棚膜,应及时清除棚膜表面尘土,增加透光度;在阴天或雨雪天,棚室内最好安装日光灯,补充光照,提高棚温;在树形上尽量选用透光好的纺锤形;晴天注意及时放风透气,保持棚室温度在摄氏28度以下,相对湿度在60%左右为宜。及时喷药按杏树的不同生长期及时喷药保护。萌芽前喷5波美度石硫合剂;谢花后喷70%甲基托布津1000倍液;果实膨大期喷80%多菌灵600~800倍液;新梢速生期喷65%代森锰锌1000倍液。谢花后及时清除果面附着物,保持果面洁净谢花后,及时清除未凋落的花瓣,并去掉遮盖杏果的叶片,以防附着果面引起烂果。及时摘除病果,集中处理疏花、疏果,合理负载。对结实力强的品种,开花坐果多时,应疏花、疏果,一般以果实成熟时不相接触为宜。