

3公分红双喜油桃苗品种 嫁接油桃苗价格

产品名称	3公分红双喜油桃苗品种 嫁接油桃苗价格
公司名称	泰安市建岳农业科技有限公司
价格	3.50/棵
规格参数	品种:油桃苗 地径:1公分 厂家:泰安
公司地址	山东省泰安高新区北集坡办事处季家庄村（注册地址）
联系电话	0538--8912239 18562357999

产品详情

红双喜油桃苗果实圆形，果顶平，缝合线浅，两半部对称。果实大，平均单果重180克，大果250克。果皮底色橙黄，果面80%~98%着红至紫红色，十分漂亮。果肉橙黄色，硬溶质，风味浓甜，可溶性固形物含量13%。离核。泰安地区6月25日左右成熟，果实发育期90天。需冷量650小时左右。该品种树势中庸，树姿较开张，采用3米X4米株行距、三主枝整形方式，种植后第三年亩产913千克，第四年亩产2600千克。各类果枝均能结果，花为铃型，花色深粉红，花粉多，自花结实，丰产。综合评价及栽培技术要点:优良的大果形早熟油桃品种。花有柱头先出的现象，在生产中应配置授粉品种和避免在易发生晚霜的地区种植。该品种果实上色早，在6月中旬以前已经达到可采成熟度色泽要求，但此时果个偏小，同时由于具有很好的硬度和均匀一致的成熟度，建议适当晚采(即可达到树上成熟)。冬剪时结果枝适当长留，着果后再疏果，以确保产量。

桃树春季是病虫害高发期。危害桃树的蚜虫有桃蚜、桃粉蚜和桃瘤蚜三种，这三种蚜虫都以刺吸式口器吸食桃树嫩梢和叶片汁液，被害后的桃叶花白卷缩，严重时脱落，既影响芽的形成，又可削弱树势。因此，应做好防治工作。

不在桃园周围种植寄主植物。桃树行间或桃园附近不宜栽培烟草、白菜等夏季寄主植物。

消灭越冬代初孵蚜虫。在春季开花以前，卵已全部孵化，但尚未大量繁殖及卷叶以前喷药，在喷药前应注意观察天敌数量，并加以保护，尽量选用对天敌杀伤力小的药剂，如菊酯类农药。

控制夏季有翅蚜扩散，压低虫口密度。花后至初夏，根据虫情再喷1~2次农药，把有翅蚜消灭在迁飞以前。

尽量压低越冬蚜虫数量。在河北秋季10月下旬至11月初，迁返桃树虫口数量大时，可喷药，以减少越冬数量，常用的药剂有50%的辛硫磷乳剂2000倍液，50%的灭蚜松可湿性粉剂1500倍液，20%的速灭

杀丁乳油2 000倍液，10%的氯氢菊酯乳油200倍液，25%的敌杀死乳油2 500倍液或吡虫啉2 002 500倍液。根据多年的防治经验，萌芽前整园喷1遍5波美度石硫合剂，谢花后及时喷1-2遍吡虫啉或菊酯类农药，就可取得较好的防治效果。