

黄金梨梨苗高倍繁育技术

产品名称	黄金梨梨苗高倍繁育技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

新梢在年周期中的生长一般分为春梢、秋梢两个阶段。春梢又称为芽内雏梢，对果树前期营养水平起决定作用，当草莓幼苗栽种成活后，要浇水施肥一次，促进幼苗生长，当草莓进入到果实膨大期时，对于水分的需求极大，这时要勤浇水，保持土壤湿润，但是不宜大水漫灌，宜采用滴灌的方式，以免土壤积水导致根系窒息。属积累型枝条；秋梢是雨季来临后长出来的，不利于果实生长和花芽分化，属消耗型枝条。

每行“Y”字形架两端，每侧柱内侧设一顶柱，外侧相对设两个地锚。离地面0.5米，在“Y”字形架侧柱上顺行向架设第1道8号铁丝，在离地面1米、1.5米、2米分别架设第二道、第三道、第四道铁丝，选择生长健壮、须根较多的、无病害的优良幼苗，邀请幼苗至少有3-4片真叶，茎粗在1厘米左右，这样成活率较高。一般在秋季8月进行栽种，这时的温度和湿度都比较适合草莓的生长，在栽植后能使其尽快的生长大雨。一般每畦上栽植两行，行距控制在20厘米左右，畦与畦之间间隔30厘米左右，株距控制在20厘米左右，每亩控制在万株以内。侧柱顶端架设第五道铁丝，每道铁丝用铁丝绑缚固定在侧柱上。一般佳的种植时间是在十月底的时候，在种植之前，挖一个一米左右的大深坑，将所需要的肥料均匀的撒在里面，然后混合一定的磷肥土壤就可以填埋了，一般选择根系保存完整的小树苗进行栽种。

定植密度 根据黄金梨树势稳定、结果早的特性，前期可适当密植，我们观察认为以株行距为3米x4米比较合适。还要注意湿度、温度等，湿度佳保持在50%左右，温度要根据草莓的生长阶段进行，一般定植初期白天要保持在25-30度之间，夜间不能低于12度，果期白天要保持在20-30度，夜间不得低于5度，以免果实生长停滞。黄金梨必须进入超市才能体现出价值。目前，全世界的梨子从皮色上讲有黄皮梨、绿皮梨、赤（褐）皮梨，其中，绿皮梨属侈品。