

晚秋黄梨梨苗生长期温度管理技巧

产品名称	晚秋黄梨梨苗生长期温度管理技巧
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

栽植第二年亩产可达750-1250kg，第三年2000-3000kg，四年后亩产超过5000kg。将芽眼朝上，覆土盖草即可。一般11-12月种植，来年春季1-2月份即可发芽，待5-6月时生长到40-50厘米时即可挖出定植。灌水方法可采用沟灌、滴灌、渗灌等，旱地梨园可采用穴贮肥水法。雨季前要疏通梨园内外排水沟，保证梨园内50cm以上土层雨后积水不超过36h。

栽植覆土后，从地面向上40cm处将树干剪掉，剪口处可用油漆点抹，以防风干。在麦地栽种的，必须将顺树行中的3~4垄麦苗锄掉，并培好垄沟，便于旱时浇水和通风透光，否则，树苗会因无法浇水而死亡。一般用来培育无病苗木和大量育苗，目前在生产上应用较广，它采用组培快繁技术，不仅能在短时间内活动的大量幼苗，还能脱去花叶病等病害，对产量有明显提高作用。施农家肥，喷洒无毒生物农药，保证了绿色食品的起点；富含钙、铁、锌、钾、硒等多种微量元素及维生素B和C、胡萝卜以及苹果酸、柠檬酸等有机酸和果酸，在进入到3月时，气温回升稳定下来，桃树相继进入到萌芽、开花期和新梢生长期，这几个时期都有消耗大量的养分。所以为了满足桃树生长发育所需的养分，就要及时追肥，尤其是对于去年生长弱势的结果树或者产量较高的果树，在萌芽前可以适当的追施氮肥，可以促进植株生长发育以及坐果。而对于生长较旺的植株可以不施，以免造成果树徒长，不利于开花坐果。这些成分对于人类非常有益，特别是其所含的天门冬素，对人体健康尤其是肾脏具有特殊的医疗保健功效。

树苗栽上后20d应浇水1次，此期间不得缺水，以免影响成活。先开的花坐果率高，果实发育快、质量好。分株繁殖也是用吸芽进行繁殖，在吸芽生长到40厘米以上时可以将其分株，留作下一代的母株或者种苗。分株是将吸芽旁的土壤挖开，用工具将其和母株分离开，挖出后，将过长和受损的根系剪除，涂抹草木灰后置于阴凉处阴干，就可以栽种了。梨树开花比苹果早，一般秋子梨品种开花早，花期持续1周左右。