## 山东烟台鲁丽苹果苗种植基地-九州红家庭农场

| 产品名称 | 山东烟台鲁丽苹果苗种植基地-九州红家庭农场                        |
|------|--|
| 公司名称 | 泰安高新区九州红苹果种植家庭农场                             |
| 价格   | .00/棵  |
| 规格参数 | 嫁接口粗度:0.8-1.2厘米<br>苗木高度:1.3-2米<br>鲁丽苹果苗:1.5米 |
| 公司地址 | 高新区北集坡街道格子村87号                               |
| 联系电话 | 15666930065                                  |

## 产品详情

山东烟台鲁丽苹果苗种植基地-九州红家庭农场鲁丽苹果苗苹果性喜冷凉干燥、 日照充足的气候条件。 一般认为 , 4~10 月生长期的平均气温 12 度~18 度最适于苹果的生 4 长。 夏季温度过高 , 平均气温 > 26 度时, 花芽分化不良, 果实发育快, 不耐贮藏。 果树栽培的实际管理者是知识水平有限的农民, 这么 庞大繁杂的结构和级次许多人都难以掌握红色品种鲁丽苹果苗成熟前适宜的着色温度为 10 度 ~ 20 度 , 如昼夜温差小, 夜温高, 则上色困难。 主枝过粗过大, 超过主干的二分之一; 侧枝过大超过主枝的二 分之一或三分之一;背上枝组过大,形成树上树;枝头枝组过大严重影响光照和扰乱树形对照谁北地区 气候条件 ,尤其是中熟红色品种在温度方面离最适要求有一定的差距 ,往南至长江流域 , 则这种差距加大。 世界苹果主产区的年降水量约在 500 毫米~800 毫米。 花芽分化和果实成熟期 , 要求空气比较干燥,日照充足,则果面光洁,色泽浓艳, 花芽饱满。养分运输路线太长,无效消耗太多,费工费力如雨量过多, 日照不足, 则易造成枝叶徒长, 花芽分化不良 ,产量低而不稳 ,病虫害严重 ,果实质量差。 淮北地区年降水量在 800 毫米左右 , 但分布不均, 时有春旱、伏旱或秋旱发生, 万寿菊在扦插繁殖过程中, 容易出现腐烂, 不易成活。经过 几年的摸索,笔者总结出了以下几条经验,供参考。基质的准备。基质采用40%的谷壳灰和60%的河沙 拌匀,谷壳灰不仅疏松排水,而且能有效防止插穗的腐烂。基质拌匀后,适量喷水,使基质含水量达60 %左右,喷水一个小时后使用。插穗的准备。万寿菊的扦插一般在5月至8月,这时可利用万寿菊修剪下 来的枝条进行扦插,一般留3节至5节,有无顶芽均可。插穗基部的叶片要修剪干净,以免散失过多的水 分。7~8月份多数年份雨量又过于集中,故灌排措施均需加强。鲁丽苹果苗苹果为喜光性树种。 光照充足 , 有利于正常生长和结果 , 有利于提高果实的品质。 同品种对光照的要求有所差异。 淮北地区年日照时数在 2000 小时以上 ,基本上能满足苹果生长发育的需要。 乔化砧用种子繁殖。 秋播或沙藏层积后春播。 低温层积的天数约30~60天。 针对果树这个顽疾,多少专家献计献策,但矮 化密植更是无人敢提,有些人甚至提出了稀植以适应大冠。这看似解决了当前果园密闭的根本办法,却 背离了果树管理技术发展的正途。事实上,问题的核心不在一亩地栽了多少棵树,而在果树的结构级次 。矮化砧必须用扦插、 压条或分株的方法进行繁殖 ,以保持矮化特性。嫁接用T形芽接法 , 在秋季芽接 ,当年形成半成苗。 芽接未成活的砧木苗 ,当年可补接一次 ,如仍未成活 , 以及当年不够嫁接粗度的砧木苗,在第二年春天进行枝接。在大冠稀植向小冠密植栽培转化过程中,因 整形修剪不当,使树形结构普遍出现了问题 枝接一般多用切接或劈接法。 半成苗在春季萌芽前剪砧, 接穗抽稍后要及时抹除砧蘖,以后加强管理,

至秋季即可出圃。矮化砧的利用有自根砧和中间砧两种方式。 我国多推广后一种方式。 果树栽培的实际 管理者是知识水平有限的农民,这么庞大繁杂的结构和级次许多人都难以掌握矮化中间砧苹果苗是由基 砧、中间砧和接穗品种三部分所组成 , 所以需要嫁接两次。 它的优点是 , 通过基砧的选择 , 可以扩大矮化砧应用的范围,同时可加快矮化砧繁殖与利用的速度。年复年,总是让强旺长条变成结果 "枝吊"。对多余、衰弱的"枝吊"逐年清理,使结果"枝吊"的年龄不超过6年生,即可做到枝势不弱 ,以长换短的健壮结果"枝吊"满树,年年丰产,立体结果,结好果(这是"珠帘式"树形的基本特点) 。 利用矮化中间砧达到矮化效应 , 必须使其保持 25 厘米以上的长度。 在一定范围内 , 随矮化中间砧的加长,矮化效应也相应提高。所以苗木的有成出回一般需要3年的时间。 鲁丽苹果苗经济寿命较长 , 建园前园地选择和规划非常重要。 苹果园宜选上层在 80 厘米 ~ 100 厘米以上而地下水位较低之处。 规划中除果园小区外 , 大小道路、 排灌渠道、 防护林、 建筑物等都应列入设计项目。 平面结果,无法完成树形小区面积应占果园总面积的 80%~85%。品种可根据当地风土条件、 市场需要及交通等综合考虑。 盆土:如果长期不换盆换土,造 成养分流失,盆土板结、排水不畅,植株生长得不到充足的氧气,叶片生长受影响,进而波及君子兰的 正常开放。缺肥:如果不及时施肥肯定会影响君子兰生长态势,养料都不够,哪能开花呢?e.花盆:过 大过小的花盆都有可能导致君子兰不开花。花盆过小时根系无法舒展,光合作用的养分就少;花盆过大 时根基生长不稳。君子兰不开花怎么办夏天要把君子兰放在室内或者没有阳光直射的地方养护;保持温 度在15~25 ,并且及时通风,朝君子兰周围环境喷雾,保持空气湿度;及时换盆、更换土壤,保证君子 兰的生长有充足的养分;应该根据君子兰具体的植株大小,选择合适的花盆。早熟品种虽然由于成熟期 气温较高,果实肉质较疏松,品质优良者不多,也不耐贮藏,食用期短,但因其成熟期早, 对调节市场供应仍有其一定的价值。 对强、长的枝条先让其成花结果,以果治旺,2~5年生的幼树基本 上不疏枝。在早结果的同时,有足够的长条发生,通过调节,就可以连年结果:对进入盛果期的红富士 ,不必短截外围枝,更不必用短截手法培养枝组,只要及时疏除密挤的、衰弱的、严重影响光照的枝条 ,保证树冠夏季的透光度在30%左右即可。改传统的短截为主的手法为只疏不截,实际上是省工省力, 不人为破坏树体稳定形,顺其自然,是简易修剪的体现,能限度的减少人为促发长条的数量,节约树体 营养。特别是淮北地区 ,可以利用其春季升温比北方早而快的特点发挥其优势适量发展。 中熟红色品种因成熟期气温偏高而昼夜温差较小 ,不利上色。可选熟期稍晚、 容易着色的短枝型品种 , 或选着色良好的中晚熟品种或优系(如新乔纳金等)。养分运输路线太长,无效消耗太多,费工费力富 士系品种在雨量较多的淮北偏东地区, 往往轮纹病发生较重, 可在雨量较少的西部地区发展。