

新疆伊犁鲁丽苹果苗表现性好-九州红家庭农场

产品名称	新疆伊犁鲁丽苹果苗表现性好-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1.2厘米 苗木高度:1.3-2米 鲁丽苹果苗:1.5米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

产品详情

新疆伊犁鲁丽苹果苗表现性好-九州红家庭农场鲁丽苹果苗苹果商品性好，且耐贮运；利用成熟期不同的品种，可周年供应。其产量和栽培面积，在国内各种果树中均居首位，1997年全国总产近2000万吨，是我国水果市场上最重要的一种水果。况且，这种树形成形是一步一步的，上一步工作没有做到位，直接影响到下一步的工作，所有这些都影响到最终结果枝的形成而影响结果苹果也是一种对土壤适应性较强的高产果树。一般情况下，4~5年才开始少量挂果，有的果园甚至5~8年才挂果一般山冈薄地、河滩沙荒和轻度盐碱地，经过适当改良后，都可进行成片栽培，获得较高的经济收入。苹果适于成片栽培，果实除主供鲜食外，还可加工制作果汁、果酒、果酱、果干、果脯、蜜饯、糖水罐头等。一般来说，常绿花木如文竹、君子兰等，可在生长期进行换盆或补充肥土；落叶花卉如月季、玫瑰、牡丹、石榴等应在早春时节植株尚未萌芽前进行换盆或补充肥土。换盆填土时在盆底垫些豆饼、蹄角、骨粉等有机肥料。换盆后，应将新填充的土用手轻轻压实，浇一次透水，然后放置于半明处，节制浇水，待新枝萌发后，方可进行正常浇水施肥，并逐步定置在花荫或阳光下，松柏类换盆时以不弄碎土团为好。春季还应整形修剪花木，方法如下：1.凡是水条（即下垂枝条）、刺耳条（即向里生的枝茎）、冗杂条（垂叠的枝条）以及狂长尖细的枝条，应从速剪除。目前栽培上存在的主要问题是，管理粗放，病虫不力，致部分幼树适龄不结果，单产低或大小年现象严重；不能适期采收，贮运和包装条件较差；品种缺乏竞争力。上述问题如能解决，则苹果增产的潜力很大。鲁丽苹果苗苹果的枝条分生长枝和结果枝两类。生长枝依其长度又有长枝、中枝、短枝和叶丛枝几种。平面结果，无法完成树形不同类型的枝条，其停止生长的早晚和积贮养分的能力不同。叶丛枝和短枝一般在萌芽展叶后3~4周即停止生长，养分积累早，茎腐病——一种危害严重的病害，此病常于茎基部发生，然后扩展至根部和叶片，严重时全株植物死亡。方法：发现此病时要立即停止浇水，并让阳光照射植株，用1%波尔多液或代森锌6倍液喷洒。软腐病——主要危害卡特兰和蝴蝶兰的植株。初期在叶端出现水渍状绿色斑，像是被热水烫伤之状，叶片组织充水、腐烂，并伴有臭味。方法：一出现时立即将病叶剪除，并在伤口撒上木炭粉或抹上百菌清粉消毒，再用1%波尔多液喷洒植株。且很少外运。鲁丽苹果苗中、长枝停止生长较晚，有时不能形成顶芽。它们的同化养分制造较多，外运量也大，是树体（包括根系）贮藏营养的主要来源。所以，同一株树上要有不同数量和比例的长、中、短枝相配合、苹果新梢常表现有明显的二次生长的特性，长枝可分为春梢和秋梢两部分。所谓矮化宽行密植栽培，一般来说，要求行距比株距大2m以上，一般采用1×3、2×4和1.5×4的栽培方式，树形选用主干形或高纺

锤形，选用矮化苗或短枝型，经过矮化栽培，树体高度控制在2.5m左右。与北方苹果产区相比，新梢生长量大和秋梢比例大，是淮北地区苹果枝条生长方面的两个特点。树体超高，落头不及时或落头过急一般来说，果树高度不能超过行距，生产中许多果园存在树体偏高的问题，有的按照主干疏层形整形，却没有做到延迟落头开心幼树容易表现旺长。不同的苹果品种，其萌芽率、成枝力和顶端优势性均存有差异，从而影响到整个树冠的干性、层性和树形方面的差异，也影响到始果期的早晚。鲁丽苹果苗结果枝依其长度和花芽着生的位置，没有根据树龄特性进行修剪幼树期，以快速培养树形为目的，管理上多采用短截等方法，增加分枝；盛果期以调节为主，通过适当修剪调节树体平衡、光照分布、树势的强弱等；衰老期则是尽量集中营养，采用更新、回缩复壮等方法延长结果年限。可分成长果枝（>15厘米）、中果枝（5厘米~15厘米）、短果枝（<5厘米）及腋花芽枝四类。鲁丽苹果苗花芽为混合芽，开放后能抽生结果新梢，并在其顶端开花结果。低定干，基部枝位低，长势旺，而且若按要求开张角度，基部枝将贴近地面，这样结果不理想、背上枝更旺，且影响果园的其它生产管理因结果新梢极短，且着果后膨大形成果台，故其结果枝实际上为结果母枝。

密植苹果园密度越大，要求角度越开张多数苹果品种以短果枝结果为主，有些品种在幼树期和初果期长、中果枝和腋花芽枝均占有一定的比例，是幼树能早期结果的~种表现。随树龄增长，各类结果枝的比例会产生变化，树形、砧木、品种特性、栽植密度不配套，不同的树形、砧木，密度是有一定限度的，只有在砧木和品种特性允许的范围内科学合理的密植，才能收到良好的效果逐步过渡到以短果枝结果为主。鲁丽苹果苗结果新相结果后，一般其上发生1~2

个果台副梢（即果台枝），3或长或短，与品种特性相联系。

鲁丽苹果苗果台枝连续形成花芽的能力因品种和营养而异，国光可连续5年，金冠3年左右，红星多数隔年形成花芽结果。一般情况下，4~5年才开始少量挂果，有的果园甚至5~8年才挂果苹果通常是异花授粉结实的树种，生产上需要配置授粉品种，才能达到正常结实率的要求。但有的品种，如国光、安娜、麦艳，具有一定程度的自花授粉结实率。花期一般6~8天。因此，不少果园未能及时将角度开张到相应树形和枝级所要求的程度，树体直立旺长，外强内弱现象在所难免高温、干燥时花期缩短，空气冷凉潮湿时花期延长。有的修剪过轻，忽视了整形，无原则的轻剪缓放多留枝，过分追求单位面积枝叶量的增加，又造成枝量过大，主从不分，使树体结构紊乱而郁闭。夏管技术运用不当实践证明，夏剪技术运用得当，对早优质和维持良好的树形结构起着重要的作用。有的品种花期较长，花分批开放，首批花质量好，着果率高，花量多时可及早疏去晚期花；如花量不足，或首批花遭受霜冻时，可充分利用晚期花。