

# 春雪桃桃苗定植前的小妙招

产品名称	春雪桃桃苗定植前的小妙招
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

春雪桃花芽萌动期3月10~20日，盛花期4月10~18日，落花期4月16~21日，果实成熟期6月下旬，落叶期11月中旬。与其他作物有所不同的是，在扦插前，不宜在扦插基质中施入底肥。并且在扦插后枝条还未生根前都不需要施肥，如果施肥的话，会对枝条的扎根生长造成一定影响。当枝条开始生根后便可开始施肥，促进枝条的生长春雪桃树势旺，树姿开张，1年生枝黄褐色，新梢绿色，光滑，有光泽。

根系发育需要消耗营养，营养主要来源于叶片的光合作用。在果树的各类枝条中，长枝与根系的两级交换能力强，长枝上叶片的光合产物对根系的贡献大。果树一旦不发长条，根系就会发育不良蓝莓是比较喜水的，特别是在扦插后要保证充足的水分促进枝条生根，我们要保证土壤湿润。但是要注意浇水量，不可过多也不可过少。水温也不可过低，防止对幼苗生长造成影响。扦插后比较重要的浇水时间在每年的5-6月，这个时候枝条逐渐长出叶片，但是根部还没有完全生长出来。如果水分不足的话，枝条难以生根，严重的时候导致枝条死亡。当枝条叶片逐渐变绿后，则代表着枝条已经开始生根。树势就会衰弱。选择成熟早、需水量小、耐储藏、自花结实力强、丰产稳定、综合性状优良的品种，如曙光、华光、早红株、丹墨、艳光、瑞光等。为了提高光能利用率，油桃应南北行向栽植，株行距0.8~1.0米×1.2~1.5米。

因此应追施养分而且含量相等的氮磷钾复合肥：这期间虽然果实需用的磷、钾肥较多，但在缺失氮元素的情况下，会影响叶片的生长，增强生长能力。在施肥的时候要注意肥料的形态，肥料以液态肥为主。控制好施肥用量，防止产生肥害。在其生长前期大概5-7天一次，并且每次施肥后要注意清除叶片上的肥料，防止烧叶。降低光合作用的吸收。很多苗圃基地只是光育苗，当地并没有结果桃树，接穗要去外地春雪桃基地购买，根本不能保证桃苗纯度，给果农造成不可挽回的损失。