

# 云南红河2公分鲁丽苹果苗种植基地-九州红家庭农场

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 云南红河2公分鲁丽苹果苗种植基地-九州红家庭农场                     |
| 公司名称 | 泰安高新区九州红苹果种植家庭农场                             |
| 价格   | .00/棵  |
| 规格参数 | 嫁接口粗度:0.8-1.2厘米<br>苗木高度:1.3-2米<br>鲁丽苹果苗:1.5米 |
| 公司地址 | 高新区北集坡街道格子村87号                               |
| 联系电话 | 15666930065                                  |

## 产品详情

云南红河2公分鲁丽苹果苗种植基地-九州红家庭农场当前苹果栽培中，密植栽培已成主要趋势，2公分鲁丽苹果苗密植栽培也是缩短生产周期、提高产量和品质的重要手段。在苹果高密栽培中，树形选择和修剪用法是很关键的问题。在密植栽培中，目前国外运用较多的树形主要有细长纺锤形、纵轴形和超细纺锤形等。2公分鲁丽苹果苗细长纺锤形适合于树高1.8-2.4米，每亩栽115-247株，因矮化砧木固着性差及整形本身的需要，整形过程中需设支柱。主枝过粗过大，超过主干的二分之一；侧枝过大超过主枝的二分之一或三分之一；背上枝组过大，形成树上树；枝头枝组过大严重影响光照和扰乱树形定植时选用有分枝的大苗，定植后头几年很少修剪，否则会刺激生长而延缓结果。这样做虽然能起到增加坐果率和促进果实增大的作用，但因缩剪后，枝轴变短，不利于形成单轴、细长、斜生、下垂、松散型的优良枝组系统。齐花剪这个问题上，主要还应该考虑花枝的势力，壮枝搞齐花剪，则容易形成大小年；弱枝不搞齐花剪，则容易结下小蛋蛋。强旺的主枝疏掉，留者弯倒削弱长势促花。当第三或第四年树体开始交接时，要有选择地疏枝。疏枝时基部留2-3厘米的短桩，利用下部瘿芽或隐芽促发弱枝，将来成为结果枝。生产当中还应该考虑果品生产目标等其他因素，确定合理的枝量树枝达到预定大小后，通过回缩修剪手法维持树冠和使树体保持圆锥形。冬剪原则中干上着生的主枝，粗度要小于中干粗的1/2，中干不短截。莎草科杂草发生规律莎草科杂草，为单子叶植物纲的禾草样草本植物，主要分布于潮湿地区。一般为多年生草本，较少一年生；多数具根状茎，少数兼具块茎。通常叶片窄、长、叶脉平行，无叶柄，叶鞘包卷，无叶舌，叶基生或秆生；茎三棱，通常空心，无节，横断面常为三角形。茎的高度从数厘米至4厘米不等。花序多种多样，有穗状花序、总状花序、圆锥花序、头状花序或长侧枝聚繖花序等；小穗单生、簇生或排列成穗状或头状，具2至多数花，或退化至仅具1花。及时疏掉密挤枝和进行老枝更新，保持良好的通风透光条件。侧生分枝上不留直径大于其直径1/2的分枝。疏除下部小枝，壮枝回缩到弱的下垂枝处。树形、砧木、品种特性、栽植密度不配套，不同的树形、砧木，密度是有一定限度的，只有在砧木和品种特性允许的范围内科学合理的密植，才能收到良好的效果短枝及时更新，防止结果部位外移。因此，不少果园未能及时将角度开张到相应树形和枝级所要求的程度，树体直立旺长，外强内弱现象在所难免进入盛果期后限制树体高度，维持树体上下平衡，内外结果。2公分鲁丽苹果苗纵轴形适用于亩栽82-148株。整形时需设支架，一般用5条等距离的水平铁丝加上支柱做成，或者每株用

两条水平铁丝加一根垂直木棍或竹竿，木棍绑于铁丝上。但目前生产中出现的的问题是：不规范的拉枝方式，影响了规范树形的培养。不能按树形要求拉枝到位，或固定时间太短，效果不明显。过早拉枝，限制了延伸；背上直立枝多且旺长。拉枝过晚，枝间又造成郁闭。整形完毕全树高3米左右。修剪原则为能早期丰产，前期很少修剪。定植用独干苗时，植后定干；用分枝苗则不需定干。

中干不短截，有时疏掉强中干而换成弱中干时也不短截。这样既利于早结果、控制树势，又限制了树体高度。纵轴形中干较弱，分枝稀疏，需将其绑到铁丝或支柱上以防折断。各个时期的目标不一样、树体特性不一样，采用的修剪方法也就不同，生产当中，许多人不分树龄都采用同一模式，显然是不合适的。过度的强调修剪作用，而忽略其他配套措施果树管理是一个综合管理，生产中有许多人过分强调修剪作用，而忽略了其他方面（比如肥水管理方面、花果管理方面、病虫害方面等）配合措施，出现了好多问题，其实修剪只是一个调节过程，主要是调节树势、调节光照和调节负载三方面的作用，如果说这三方面没有问题，果树则可以不剪，生产中许多人对修剪的作用认识模糊，稀里糊涂的剪，并不知道为啥要剪，出现问题在所难免。同时夏季通过对前部第三、四个侧枝摘心来促进分枝。而枝组配置上主要问题是：外多内少、外强内弱，以及枝组过高、过大、过长，这样相互影响，扰乱树冠，恶化光照。侧枝摘心在枝条长5-10厘米时进行，可间隔两周再次摘心，促进分枝。定植后2-3

年每年都要摘心。摘心做得好则冬剪时仅去掉旺枝和下部冗枝。一般绿化在图案设计上较常用的形状有条带状和放射状，具体形状有方形、圆形、椭圆形、扇形、波浪形、文字和数字形以及特殊绿化中的不规则形等等，图案的主体与环境要相辅相成，图案大小要与绿地面积大小相协调。色块植物的选择和搭配植物的选择首先要考虑其生态习性，要能适应绿地的环境，其次要符合造景的原则，植物的本身的美要与景观和文化相符。植物搭配不可色彩单一，要多种色彩的植物搭配造景，搭配组合的方法要与图案相符，还要使整个景观更显生动、自然，所以在选择植物的时候要考虑植物的色彩和其季相变化。

对2-3年生的分枝回缩到基部花芽或弱枝上；使结果部位靠近中干。第三、四年出现遮荫时，需疏枝透光，首先分1-2年疏掉下层分枝，余下4-5个分枝永久保留。冬剪疏枝时保留足够的结果枝，有利于控制中干的长势。与细长纺锤形一样，维持树体大小也靠回缩更新。行间通过回缩及更新维持圆锥形树冠，行内的树形则不重要，形成树墙。对于纵轴形的树来说，控制中干要有耐心，如果修剪过早，会促使中干旺长形成“树上长树”。

结果枝由于多种原因难以形成，造成枝类构成不合理需等到到早期的产量足能树势时开始修剪。

一般4-6年进入大量结果期时再修剪。此时树体可能已高于顶层铁丝1.2-1.5米，要落头至接近顶层铁丝的部位，宜从2-3年生枝段剪截。