## 广西阳光玫瑰葡萄苗详情论述、阳光玫瑰葡萄苗施肥时间

产品名称	广西阳光玫瑰葡萄苗详情论述、阳光玫瑰葡萄苗 施肥时间
公司名称	泰安市林泽苗木有限公司
价格	4.50/株
规格参数	厂家:林泽苗木 苗高:50cm 苗粗:0.5cm
公司地址	山东省泰安高新区北集坡街道办事处西百子坡村 254号(注册地址)
联系电话	15376220677

## 产品详情

广西阳光玫瑰葡萄苗详情论述、阳光玫瑰葡萄苗施肥时间果树与栽培:一、苗木假植:苗木运到后,如不是栽植季节应先进假植。假植方法:选择房后背阴处挖沟,一般沟深40厘米、宽80厘米,长度根据苗木多少而定。如土壤干燥,先灌透水,待水透后再挖沟。把苗木剪到定干高度以上约10厘米,解开捆扎苗木根系的绑绳,将苗木倾斜放置,与沟底呈45度角。把根系均匀地排列在沟内斜面上,然后把沟面裸露垢苗木面端覆土盖严。如果苗木根系有失水现象,可选浸水12-15小时后再假植。二、苗木株行距:栽植株行距因地势、土壤类型、树种、砧木等而有所不同,土壤瘠薄的山地、荒滩或使用矮化砧木的苗木可以略密植,平原、肥沃土壤可稀植。l%的尿素液,每株施入量为5-IO千克,以后随着植株的长大,逐步增加浓度和数量o因为磷是发根肥,可以促进生根,所以在4-5月份,还必须加入磷肥,浓度为O.3-O.5%,连加2-3次,6-7月间再加追钾肥,施入浓度为O.3-O.5%,可加快植株组织成熟,全年追肥数至少在8-IO次以上,同时,平时结合病虫防治进行叶面追肥,尿素和磷酸二氢钾的浓度为O.8-I米时再次摘心,促进二次副梢的发生o夏季管理中,可在主蔓上适当留2-3根侧生副梢,这些侧生副梢可以放任不管,任其横向或下垂生长,如果生长势强壮的可在IO片叶时摘心,促进老熟,春光葡萄苗 蜜光葡萄苗

果树与栽培:一、苗木假植:苗木运到后,如不是栽植季节应先进假植。假植方法:选择房后背阴处挖沟,一般沟深40厘米、宽80厘米,长度根据苗木多少而定。如土壤干燥,先灌透水,待水透后再挖沟。把苗木剪到定干高度以上约10厘米,解开捆扎苗木根系的绑绳,将苗木倾斜放置,与沟底呈45度角。把根系均匀地排列在沟内斜面上,然后把沟面裸露垢苗木面端覆土盖严。如果苗木根系有失水现象,可选浸水12-15小时后再假植。二、苗木株行距:栽植株行距因地势、土壤类型、树种、砧木等而有所不同,土壤瘠薄的山地、荒滩或使用矮化砧木的苗木可以略密植,平原、肥沃土壤可稀植。

I%的尿素液,每株施入量为5 - IO千克,以后随着植株的长大,逐步增加浓度和数量o 因为磷是发根肥,可以促进生根,所以在4 - 5月份,还必须加入磷肥,浓度为O.3 - O.5%,连加2 - 3次,6 - 7月间再加追钾肥,施入浓度为O.3 - O.5%,可加快植株组织成熟,全年追肥数至少在8 - IO次以上,同时,平时结合病虫防

治进行叶面追肥,尿素和磷酸二氢钾的浓度为O.8-I米时再次摘心,促进二次副梢的发生o 夏季管理中,可在主蔓上适当留2-3根侧生副梢,这些侧生副梢可以放任不管,任其横向或下垂生长,如果生长势强壮的可在IO片叶时摘心,促进老熟,春光葡萄苗 蜜光葡萄苗一般症状是叶片黄化干瘪,看上去嫩叶生长不精神,此时应加强肥水管理补水。六、病害。由于雨多气温高,得病机会增多。凡雨后应随即查看识别是否患病和由何种病菌侵染引起病害,再对症下药。七、土地板结害。新栽小葡萄苗如土壤板结,生长受到影响,常常发生"僵苗"。防治方法是不要在雨天栽苗,栽苗后应小水浇灌,并在每次浇水后或雨后锄土松土,再合理追肥,或对小苗平茬处理,让它重新发芽。