

广西阳光玫瑰葡萄苗详情论述、阳光玫瑰葡萄苗施肥时间

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 广西阳光玫瑰葡萄苗详情论述、阳光玫瑰葡萄苗施肥时间 |
| 公司名称 | 泰安市林泽苗木有限公司 |
| 价格 | 4.50/株 |
| 规格参数 | 厂家:林泽苗木 苗高:50cm 苗粗:0.5cm |
| 公司地址 | 山东省泰安高新区北集坡街道办事处西百子坡村254号(注册地址) |
| 联系电话 | 15376220677 |

产品详情

广西阳光玫瑰葡萄苗详情论述、阳光玫瑰葡萄苗施肥时间果树与栽培:一、苗木假植:苗木运到后,如果不是栽植季节应先进假植。假植方法:选择房后背阴处挖沟,一般沟深40厘米、宽80厘米,长度根据苗木多少而定。如土壤干燥,先灌透水,待水透后再挖沟。把苗木剪到定干高度以上约10厘米,解开捆扎苗木根系的绑绳,将苗木倾斜放置,与沟底呈45度角。把根系均匀地排列在沟内斜面上,然后把沟面裸露苗木面端覆土盖严。如果苗木根系有失水现象,可选浸水12-15小时后再假植。二、苗木株行距:栽植株行距因地势、土壤类型、树种、砧木等而有所不同,土壤瘠薄的山地、荒滩或使用矮化砧木的苗木可以略密植,平原、肥沃土壤可稀植。1%的尿素液,每株施入量为5 - 10千克,以后随着植株的长大,逐步增加浓度和数量。因为磷是发根肥,可以促进生根,所以在4 - 5月份,还必须加入磷肥,浓度为0.3 - 0.5%,连加2 - 3次,6 - 7月间再加追钾肥,施入浓度为0.3 - 0.5%,可加快植株组织成熟,全年追肥数至少在8 - 10次以上,同时,平时结合病虫害防治进行叶面追肥,尿素和磷酸二氢钾的浓度为0.8 - 1米时再次摘心,促进二次副梢的发生。夏季管理中,可在主蔓上适当留2 - 3根侧生副梢,这些侧生副梢可以放任不管,任其横向或下垂生长,如果生长势强壮的可在10片叶时摘心,促进老熟,春光葡萄苗 蜜光葡萄苗

果树与栽培:一、苗木假植:苗木运到后,如果不是栽植季节应先进假植。假植方法:选择房后背阴处挖沟,一般沟深40厘米、宽80厘米,长度根据苗木多少而定。如土壤干燥,先灌透水,待水透后再挖沟。把苗木剪到定干高度以上约10厘米,解开捆扎苗木根系的绑绳,将苗木倾斜放置,与沟底呈45度角。把根系均匀地排列在沟内斜面上,然后把沟面裸露苗木面端覆土盖严。如果苗木根系有失水现象,可选浸水12-15小时后再假植。二、苗木株行距:栽植株行距因地势、土壤类型、树种、砧木等而有所不同,土壤瘠薄的山地、荒滩或使用矮化砧木的苗木可以略密植,平原、肥沃土壤可稀植。

1%的尿素液,每株施入量为5 - 10千克,以后随着植株的长大,逐步增加浓度和数量。因为磷是发根肥,可以促进生根,所以在4 - 5月份,还必须加入磷肥,浓度为0.3 - 0.5%,连加2 - 3次,6 - 7月间再加追钾肥,施入浓度为0.3 - 0.5%,可加快植株组织成熟,全年追肥数至少在8 - 10次以上,同时,平时结合病虫害防

治进行叶面追肥，尿素和磷酸二氢钾的浓度为0.8 - 1米时再次摘心，促进二次副梢的发生。夏季管理中，可在主蔓上适当留2 - 3根侧生副梢，这些侧生副梢可以放任不管，任其横向或下垂生长，如果生长势强壮的可在10片叶时摘心，促进老熟。春光葡萄苗、蜜光葡萄苗一般症状是叶片黄化干瘪，看上去嫩叶生长不精神，此时应加强肥水管理补水。

六、病害。由于雨多气温高，得病机会增多。凡雨后应随即查看识别是否患病和由何种病菌侵染引起病害，再对症下药。

七、土地板结害。新栽小葡萄苗如土壤板结，生长受到影响，常常发生“僵苗”。防治方法是不要在雨天栽苗，栽苗后应小水浇灌，并在每次浇水后或雨后锄土松土，再合理追肥，或对小苗平茬处理，让它重新发芽。