

## 莱克西蓝莓苗基地、莱克西蓝莓苗看圃起苗

产品名称	莱克西蓝莓苗基地、莱克西蓝莓苗看圃起苗
公司名称	泰安市林泽苗木有限公司
价格	4.00/棵
规格参数	苗高:50-80 分枝:3-5 状态:营养钵
公司地址	山东省泰安高新区北集坡街道办事处西百子坡村254号(注册地址)
联系电话	15376220677

## 产品详情

莱克西蓝莓苗基地、莱克西蓝莓苗看圃起苗5克~2.5克。种核极小，可食率几乎为百分之百。蓝莓是浅根、喜光植物，根系多是须根，没有粗大的主根。适合在土质疏松、土壤有机质丰盛的土壤中生长。蓝莓喜弱酸性土壤，很适合土壤的pH值在4.5~5.5之间。此外，蓝莓有一个格外的习性：就是在夏天气温高于30摄氏度和冬天气温低于15摄氏度时，蓝莓树几乎间断生长，进入休眠状况。辽宁大连区域，露地蓝莓多在4月中旬萌开展叶，5月上中旬开花，6月下旬至7月中旬老到采收，11月份进入越冬期间。根状茎分枝频繁，在地表下6~25mm深的土层内形成紧密(穿插)的网状结构。新发生的根状茎一般为粉红色，而老根状茎为暗棕色并且木栓化。矮丛蓝莓的根系分布在上层中的有机质层。蓝莓苗叶 蓝莓叶片互生。高丛、半高丛蓝莓和矮丛蓝莓在入冬前落叶。因各个品种不同有的落叶有的不落叶。叶片大小由矮丛蓝莓的0.7~3.5cm长度到高丛蓝莓的8cm，长度不等。叶片形状好常见的是卵圆形。大部分种类叶片背面被有绒毛，有些种类的花和果实上也被有绒毛，但矮丛蓝莓叶片很少有绒毛。

除草。在蓝莓园处理中，除草是非常重要的环节，做好了可使产量前进1倍以上。在蓝莓出产中，广泛运用化学除草剂。这是因为人工除草费用高，又易损害根系，特别是矮丛蓝莓培育，因为根状茎串生行走，几年后全部果园连成一片，根柢无法人工除草。蓝莓园常用的除草剂有敌草隆、西玛津、氯苯氨灵、2,6-二氯苯、草甘膦、百草枯等。上肥：上肥品种。施氮磷钾复合肥比施单一肥料效果好；氮、磷、钾肥三者的比例以1:1:1为宜；根据不一样品种，树高从40厘米到240厘米不等，每丛有5~12个主枝，每年不断抽生新枝，每个主枝可保存3~5个效果枝。蓝莓树的主枝在3~5年时，效果才干很强，6年往后效果才干削弱，需要更新。

蓝莓的叶片为椭圆形或长卵圆形。叶片互生，叶长从0.7~8厘米不等，因品种不一样而有别。花为两性花，乳白色或粉红色，形如钟状，有幽香气味。花期为7~15天不等。果实形状为圆形或扁圆形，呈深蓝色或亮蓝色，单果重0.

2.3 品种配备与定植时间 异花授粉是进步蓝莓产量和果实巨细的重要要素之一，高丛蓝莓自花健壮率高，而矮丛蓝莓大都品种自花健壮率极低或不健壮。异花授粉可使高丛蓝莓的座果率从67%进步到82%。因此

，在蓝莓的种植园内，起码需配备两个以上品种互相授粉，以进步产量和质量。授粉树配备比例一般为2~3:1，即主栽品种2~3行，授粉品种1行。定植时间 一年生苗的定植深度在15~20cm，而且要扶土踩紧压实，做到“三扶两踩一提苗”。该品种的一个出色特点是：果实老到期长，在长春区域从批果实老到到很后一批果实老到克连续45天时间。为一供应本地鲜果商场的品种。2.达柔 美国品种，晚熟。树体生长健旺，直立，连续丰收。果实大、淡蓝色，肉质硬，果蒂痕中，风味好。3.蓝丰 美国品种，中熟。树体生长健旺，关闭，抗旱才干极强。极丰收且连续丰收才干强。果实大、淡蓝色，果粉厚，肉质硬，果蒂痕干，具清淡芳香味，风味佳。

深翻深度以40-50厘米为好，有利于往后蓝莓的根系发育。对于土壤pH值大于5.6的地块，深翻时还需要参与恰当硫磺粉来调整土壤酸性。土壤pH值小于4.5的地块，则参与恰当石灰。留心，硫磺粉或石灰的用量要根据土壤结构状况和实际pH值，请专家测算往后恰当参与。深翻后根除石块、草根、硬木块等杂物。再把地块耙平。并按东西或南北行向，做成高40厘米，宽约1米的垄，行距为2米。定植技术 蓝莓定植分为春栽和秋栽，春栽必须在树苗萌发之前结束。秋栽，则要在树苗现已休眠后初步。辽宁区域一般在10月中旬进行。定植时，在垄上开定植穴，定植穴长、宽、深各40厘米，穴距离约为1米。蓝莓定植第2年有极少量效果，形不成产量，定植第3年进入效果期，往后产量逐年递加，第5、6年进入丰收期，丰收期内均匀亩产为1000~1500千克。经济寿数长达50年以上。适种区域：蓝莓品种繁多，根据树形特征、生态特性及果实特征，可将蓝莓简略分为矮丛蓝莓、半高丛蓝莓、高丛蓝莓和兔眼蓝莓四大类型。在我国，黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏、上海、安徽、浙江、重庆、四川、贵州等省区都可以大面积开展蓝莓培养业。