

中秋王苹果树苗批发报价，中秋王苹果树苗基地供应价格

产品名称	中秋王苹果树苗批发报价，中秋王苹果树苗基地供应价格
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	4.50/棵
规格参数	品种:嫁接苹果树苗 规格:一公分 基地:创隆园艺场
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

苹果枝干害虫主要有桑天牛、豹纹木蠹蛾等，在我市苹果产区受害较重，发生严重果园枝干受害造成树势衰弱，果园减产，甚至面临毁园的威胁，而且枝干害虫防治难度大，是生产上急需解决的问题。现将桑天牛、豹纹木蠹蛾的发生规律及防治对策介绍如下，供参考。

1 桑天牛

又名褐天牛、粒肩天牛、水牛，幼虫俗名凿木虫，属于鞘翅目，天牛科。主要危害苹果、海棠、梨、桑、榆、柳、毛白杨等多种果树和林木，成虫啃食树木枝干嫩皮，幼虫蛀食树干边材、心材及髓心，造成树势衰弱，严重时树干枯死。1.1发生规律2~3年发生一代，以幼虫在虫道内越冬。幼虫一般在5-6月份开始化蛹，6-8月份出现成虫，7月上旬为成虫出蛰盛期。成虫羽化后，先咬食寄主嫩枝皮层和心材部，咬一“U”字型刻槽，将卵单粒散产于刻槽木质部伤口内，产后用黏液封闭槽口。初孵幼虫先向上蛀食约10mm后，再向下沿树干木质部边材蛀食，逐渐蛀入心材，沿髓心向下蛀食。若寄主树干低矮幼虫可蛀至根际。幼虫在虫道内每隔一定距离咬一圆形排粪孔，两排粪孔之间的距离随虫体的增大而加长。虫道直而光滑，无虫粪，幼虫经过两个冬天，于第3年4-6月份在虫道内先咬一羽化雏形，然后作蛹室化蛹。

1.2 防治对策 人工防治。结合冬剪，剪除带有刻槽的虫枝。6-7月份成虫集中出现时期，在果园及附近林间捕捉成虫，7-8月间检查产卵刻槽或根据排粪孔情况，用小刀或铁丝刺杀卵和幼虫。 药剂防治。生长季节应用大型注射器，不带针头，将80%敌敌畏乳油、乐果乳油或50%马拉松乳油00~100倍液自下向上向第2个排粪孔内注射药液，至最下一个排粪孔药液流出为止。也可用棉球蘸药液塞入最下1~2个排粪孔内，再用泥封住。应用磷化铝片剂和毒签自天牛最下一个排粪孔塞入，然后用泥封住。 生物防治。

注意保护利用桑天牛啮小蜂，早春将带有卵寄生蜂的枝条捆成小捆挂于果园内，让寄生蜂飞出寻找天牛卵寄生。

2 豹纹木蠹蛾

又称咖啡木蠹蛾，俗名截干虫，属于鳞翅目，豹蠹蛾科。主要危害苹果、梨、核桃、石榴刺槐、香椿、玉米、棉花等多种树木和农作物，幼虫蛀食枝条，导致枝条枯死或折断。

2.1发生规律 一年1~2代，以幼虫在枝条内越冬。翌年果树萌芽时开始取食或转枝危害。5月上旬在枝条虫道内化蛹，5月中旬出现成虫。成虫夜间活动，有趋光性，白天静止不动。卵多产于枝梢上部叶片背面、芽腋、树皮缝隙或旧虫孔等处。初孵幼虫从叶主脉或芽腋处蛀入，沿枝条髓部向上蛀食，被害枝梢枯萎。幼虫稍大后转移至新梢基部蛀入取食，在枝条韧皮部和木质部之间蛀一环形沟导致枝枯。一般在第2次转梢时，多危害2~3年生枝条，最后危害多年生枝条。至11月间，幼虫停止取食进入越冬状态。

2.2防治对策 剪除虫枝。结合夏剪，根据新梢先端叶片枯萎的症状和枝条及地面上的虫粪，及时剪除虫枝烧毁。灯光诱杀。利用成虫趋光特性，在成虫出现期进行灯光诱杀。药剂防治。在虫口密度大的果园，于成虫产卵和幼虫孵化期，喷80%敌敌畏乳油1000倍液，20%杀灭菊酯2500倍液，2.5%溴氰菊酯2000—2500倍液，均可收到良好的杀虫效果。