

# 新疆肉鸡苗价格 乌鲁木齐良凤花鸡苗批发 哈密三黄鸡苗 喀什快大黑鸡苗

产品名称	新疆肉鸡苗价格 乌鲁木齐良凤花鸡苗批发 哈密三黄鸡苗 喀什快大黑鸡苗
公司名称	贵州伟静鸿农业科技发展有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.6 ( kg ) 成活:98 ( % )
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组
联系电话	18786077743 17369032651

## 产品详情

夏季气温高，养鸡要做好几个重点的防护，才能避免鸡群中暑、采食量下降、生长缓慢和产蛋下降。尤其是规模化养鸡场在夏季养鸡更要注重鸡群的饲养管理，一定要做好三降、三保和三防这三件事。

**\*\*件事：抓好“三降”——降温、降能、降密度**

### 1.降温

即降低鸡舍温度。鸡没有汗腺，体内产生的热量只能靠呼吸散失，对高温的适应能力很差。当舍温超过25℃，可在进风口设置水帘，使热空气经过冷却后再进入鸡舍。这种方法可使舍温降低4~5℃，保持降温时间6~8个小时，当舍温超过30℃时，可用高低雾量旋转嘴喷雾器，向房顶或鸡体直接喷凉水，每2~3小时喷一次，可使鸡舍温度降低6~8℃。

## 2.降能

即降低饲料能值。试验证明，在25℃以上时，鸡舍温度每升高1℃，肉鸡采食量就降低1.6%，要适当降低能量，提高蛋白质水平10~15%，可用植物蛋白代替动物蛋白饲料，可减少鸡采食腻感，增加日粮中多维生素2倍。同时可换用颗粒饲料，提高适口性，增加采食量，提高肉鸡的总摄入量。高温季节\*\*好采用夜间喂料，每晚10点到次日凌晨6点是\*\*凉爽时间，有利于肉鸡采食。其方法是：适当调亮灯泡，增加肉鸡的兴奋性，夜喂4~5次，并通过振动料桶，驱赶鸡群运动以保持旺盛食欲。此外，夏养肉鸡可利用干燥无污染的河沙做垫料，既便于肉鸡沙浴和鸡体散热，又能使肉鸡采食沙砾，有利于食物消化。

## 3.降密度

即降低饲养密度。夏养肉鸡的适宜密度：1~2周龄为每平方米饲养30~25只；3~4周龄25~15只；5周龄到出栏10~5只。每群以300只为宜，群与群间用栅栏隔开，以利内外空气流通。

第二件事：搞好“三保”——保水、保青、保通风

### 1.保水

即保证供给充足饮水。夏季气温高，肉鸡的呼吸加快，鸡体水分蒸发量大，其饮水量明显增加。因此，要设置足够的水槽，确保每只鸡都能饮到充足的水。另外，要保持饮水的清洁卫生。

### 2.保青

即保证加喂一定量的青绿多汁饲料。青绿多汁饲料营养丰富，适口性好，可促进肉鸡的食欲，帮助消化，既解渴又降温，有利于肉鸡休息。

### 3.保通风

即保证鸡舍通风良好。由于夏季气温高，呼吸频率加快，空气中二氧化碳等有害气体浓度加大。因此，要保证肉鸡充足的氧气，就必须通风，应经常打开门窗换气，有条件可安装排风扇。

第三件事：重视“三防”——防病、防湿、防蚊蝇

### 1.防病

即预防疾病。高温会使肉鸡抵抗力降低，极易发生球虫病，葡萄球菌病等。因此除在饲料中补加抗菌素外，还要进行鸡舍带鸡消毒。消毒药物要选择广谱高效、无毒无副作用有粘附性的消毒剂，如百毒杀、毒菌净、次氯酸钠等，按每平方米15毫升进行喷雾，喷雾应距鸡群50~80厘米。在正常情况下每周1~2次，炎热天每天上、下午各一次，同时将药物浓度相应降低30~50%。

### 2.防湿

即注意保持鸡舍和运动场的干燥。肉鸡\*\*适宜相对湿度为50~70%，相对湿度高于70%时，其羽毛粘连、污秽、关节炎病也会增加。特别是高温高湿的环境

，易使微生物孳生繁殖，诱导疾病的发生与传播。因此，运动场坑洼之处应填平，保持排水畅通，阴雨连绵天气，尤其要保持鸡舍干燥，防止霉菌孳生。

### 3.防蚊蝇

即防止蚊蝇侵害鸡体。夏季蚊蝇多，除注意搞好鸡舍、运动场的卫生外，鸡舍周围的杂草要除净，污水沟坑要填平，鸡舍内要钉纱窗，定期喷药灭蚊蝇，以保证肉鸡有一个安宁的环境。