

# 西安青脚鸡苗批发 天水周边鸡苗批发市场 定西良凤花鸡苗 三黄鸡苗价格

产品名称	西安青脚鸡苗批发 天水周边鸡苗批发市场 定西良凤花鸡苗 三黄鸡苗价格
公司名称	成都天鑫力禽业有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.6 ( kg ) 成都:98 ( % )
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 18030449395

## 产品详情

一、种鸡雏到场前准备工作 1、提前预热达到所需的温度，一般在26~28摄氏度，雏鸡到场后再提至32~35摄氏度，如果采用暖风炉供热，不要把热风直接吹到鸡雏身上，通过地面洒水或喷雾等方法使湿度提升到65%~75%。2、雏鸡到场前准备好凉开水、开食料、维生素、电解多维、葡萄糖等，并把配有3%葡萄糖和维生素的凉开水提前半小时放入笼内。3、调节好每个笼子挡板，如果水线和饮水器同时使用，应该把水线调节到雏鸡能饮到水的高度，如果不用，应把水线提高，不让雏鸡接触到乳头，到7天再放下让鸡使用。笼底铺垫一层小孔塑料网，防止小鸡雏出现腿部损伤，如果没有塑料网，可铺一层报纸，直至第3~4天撤掉，如果铺纸，饮水器不要放在报纸上，防止水洒在纸上，把鸡雏羽毛弄湿，使雏鸡受凉。4、计算出每个笼子的鸡只数：密度一般1~7天25~30只/平方米。二、雏鸡到场后 1、雏鸡到场后要尽快卸车，做到有条不紊，避免忙中出错。把装有雏鸡的箱子放在走道中，然后把箱盖打开，按计算好的数量把鸡放入笼子里，让鸡尽快喝到水，然后把纸盒撤出鸡舍。2、由于公鸡在孵化厅要翻肛鉴别，剪冠、断趾、免疫再加上运输等环节，会使公鸡特别弱，所以要把公鸡放在光线较强、温度较高的上层笼子里饲养，并要细心照料。

3、如果鸡苗能从笼子里跑出来，可把装鸡盒剪成一条一条的来遮挡一下门栏。4、温度：笼养育雏上层笼与底层笼温度能相差3~4摄氏度，因此把鸡放在上层育雏，然后根据密度依次往下层转，温度一般在32~35摄氏度。5、光照：由于大部分育雏笼子3~4层垂直重叠，因此灯泡要高低交叉分布，亮度越亮越好，1~3天24小时光照，以后每天减1~2小时，直到自然光照为止。平养鸡管理要点：

一、种鸡雏到场前准备工作 1、提前预热达到所需的温度，一般26~28摄氏度，雏鸡到场后再提至32~33摄氏度，通过地面洒水或喷雾等方法使湿度提升到65%~75%。2、根据鸡的数量分成几个围栏，要比实际多备1~2个，以便放弱小鸡。围栏内铺上约10公分厚的刨花或稻壳，然后根据鸡数分配饮水器和料盘，饮水器下面要垫一块砖。饮水器垫砖要求平整，一半放在垫料上面，一半放在垫料下面，饮水器和料盘要交叉摆放，以使鸡能在近的距离喝上水吃上料，密度14~15只/平方米。3、同时鸡到场前要准备好凉开水，开食料、抗生素、电解多维、葡萄糖等，并把配有3%葡萄糖的凉开水提前半小时放入围栏内，使鸡到场能及时喝上水。二、雏鸡到场后 1、雏鸡到场后要尽快卸车，做到有条不紊，避免忙中出错。按计算好的数量把鸡放入围栏内，然后把箱盖打开，卸完车后要尽快小心地将雏鸡放入围栏内，各个纸盒在不同处投放，使雏鸡均匀分布，然后把纸盒撤出鸡舍。

2、如果没有开食盘，可以把装雏鸡的纸箱切成4厘米高当饲料盘用。 3、温度：要看鸡施温。

(1)温度适宜，雏鸡均匀分布在热源周围呈点状分布。

(2)温度偏高，雏鸡远离热源张口呼吸饮水增多，食欲减退应及时降温。

(3)温度偏低，鸡挤堆站立，挤在热源中心，不断发出叽叽尖叫声，这就要加温。

(4)温度不均，雏鸡挤于热源处。要及时查清原因，以免造成损失。 4、光照。灯泡高低交叉分布，亮度越亮越好，1~3天24小时光照，以后每天减1~2小时，到自然光照为止。 三、饮水开食 1、饮水 (1)不论是笼养还是平养，雏鸡到场后，都要尽快饮到水，笼养鸡水线和饮水器同时使用，因为雏鸡对水线乳头较好奇会不断地去啄，使鸡容易喝上水，提高成活率。散养鸡，可把开食盘平放在垫料上，一手持少量的水向开食盘面洒水，使水在盘中成水珠状在灯下反光诱鸡饮水。

(2)不论是笼养还是平养，饮水器中的水都要少添勤添，饮水器每天都要清洗。(3)在饮水过程中要注意观察，把不会喝水的鸡要人工调教饮水，直到会喝为止，葡萄糖水不宜喝的时间太长，2~3小时可换成清水。 2、开食 (1)雏鸡到场饮水3~4小时后即可开食。将料用水拌潮湿后给鸡吃，能促进鸡消化和防止鸡脱水，提高成活率。(2)笼养鸡前三天可把饲料放在料桶内或垫纸上，第四天改用料槽，平养鸡前三天用开食盘或装鸡的纸盒，第四天改成小料桶。(3)鸡饮水开食12小时后应挨个触摸鸡的嗉囊，把没饮到水吃到料的雏鸡单独挑出放在备用笼(栏)内单独护理，使鸡喝上水吃上料。 注意事项 1、很多养殖户认为雏鸡到场温度越高越好，有利于卵黄的吸收，温度甚至到37~38摄氏度，殊不知这样对鸡本身发育造成了很大的伤害，高温使鸡采食下降，早期生长发育都会受到影响，羽毛蓬乱且生长缓慢。 2、不注意通风，很多养殖户认为周，雏鸡不必要通风，怕鸡受凉，这样做会使育雏期通风不良而导致育雏室内空气质量差，会破坏雏鸡呼吸道表皮细胞使其较易感染呼吸道疾病。

3、第四天关灯时要提前一小时把料撤出，使鸡充分饮上水。 4、育雏周湿度应重点监控，如果湿度低于50%，会导致生产性能差，导致鸡群均匀度较差，应立即增加湿度，防止鸡脱水。 5、笼养鸡由于上层与下层温差大，会使鸡均匀度受影响，因此在5~7日龄断喙时把大小分一下群同时把上下两层的鸡交换一下位置，有利于提高均匀度。 6、在冬季，如果鸡在运输过程中受凉，到场后不要把鸡直接放入鸡舍内，要先放在工作间内缓解一下。如果直接放在舍内，雏鸡从低温的运输车内突然到高温育雏舍内，应激增加，会加大死亡。 总之，如果周雏鸡出现异常行为或死亡率超过1%，应对饲养管理方面进行复查，找出存在的问题并及时解决。