

# 陕西汉中鲁丽苹果苗丰产性强-九州红家庭农场

产品名称	陕西汉中鲁丽苹果苗丰产性强-九州红家庭农场
公司名称	泰安高新区九州红苹果种植家庭农场
价格	.00/棵
规格参数	嫁接口粗度:0.8-1.2厘米 苗木高度:1.3-2米 鲁丽苹果苗:1.5米
公司地址	高新区北集坡街道格子村87号
联系电话	15666930065

## 产品详情

陕西汉中鲁丽苹果苗丰产性强-九州红家庭农场鲁丽苹果苗修剪分冬季修剪（休眠期修剪）和夏季修剪（生长期修剪）两类、冬季修剪的基本方法有短截、回缩和疏枝，有时把长放不剪也放在广义的修剪方法中。枝量过多，光照差，无用寄生枝多，果品质量差；枝量太少，产量难以提高，果子容易日烧短截又可分轻截、中截和重截等几种不同的程度，从而其修剪反应也不同。对枝条轻短截或长放，有利于缓和枝势、树势。对枝条中截、重截或回缩，有利于促进枝芽生长和枝组、骨干枝的更新复壮。疏枝可减少分枝，改善光照，并有抑前促后的作用，有利于花芽的形成。夏季修剪包括摘心、抹芽、疏梢、扭10梢、拿枝、拉枝、环剥等基本方法。结构级次过于庞大繁杂，鉴于这个原因，果树的树形出现了重大变革这种变革不是形状变革，而是实质性的变革——减少级次。既由原来的五级结构变为现在的三级或二级结构。减少级次才是果树变革的核心和实质，是未来发展的大势所趋。一般来说，夏季修剪对树体生长有一定的作用，能缓和枝势和树势，常有利于花芽的形成，在幼旺树上应用较多。鲁丽苹果苗苹果幼树期的修剪以选留培养骨干枝为主，同时掌握轻剪多留辅养枝，增加枝叶量，使地上部和根系的生长早趋平衡，促进成花结果。苗木栽植后，按不同树形要求对苗木进行短截，称为定干。看发育期：苗期多施氮肥，如矾肥水、豆饼水、液氨，硫按，促进幼苗生长。孕蕾期多施磷肥，如碎猪骨、鱼骨、蛋皮泡肥，过磷酸钙，能使花朵大，果实饱满。多施钾肥，如草木灰、硫酸钾，可促进根系发育，植株坚挺。植株生长旺盛期，多追肥；生长减慢期，少追肥；进入休眠期，停止追肥。看天气：雨天少施，晴天多施。看肥料：长期施用化肥，易使盆土板结变硬，宜少用；液肥施有机肥无此弊病，宜多用。看时间：夏日中午忌施热肥，因为此时盆土温度高，追肥易烧根，以傍晚黄昏时进行为宜。定干时剪口下要求有5~7个以上的饱满芽，20厘米~25厘米称为整形带。这些芽前发成技后，从中选留中心干的延长技及层主枝或较粗壮的侧生枝。每年冬季按整形要求剪截培养中心干和各级骨干枝枝头，注意剪口芽的质量和留芽方向。养分运输路线太长，无效消耗太多，费工费力位于中心于层间和主枝下部的生长枝，除过密的需疏除外，其余枝条应适当多加保留，作为辅养枝，并采用轻剪长放拉平的方法，使其能辅养树体，缓和树势及早期结果。整形带以下定干当年不扶芽，有利于主干的加速和根系的生长，发出的枝条中近地面的和拥挤的可除，其余可控制或甩放。在培养骨干、利用辅养枝的同时，在主枝、副主枝的背后、

两侧及背上应及时分别培养大、中、小各类枝组，使稳定结果。各个时期的目标不一样、树体特性不一样，采用的修剪方法也就不同，生产当中，许多人不分树龄都采用同一模式，显然是不合适的。过度的强调修剪作用，而忽略其他配套措施果树管理是一个综合管理，生产中有许多人过分强调修剪作用，而忽略了其他方面（比如肥水管理方面、花果管理方面、病虫害方面等）配合措施，出现了好多问题，其实修剪只是一个调节过程，主要是调节树势、调节光照和调节负载三方面的作用，如果说这三方面没有问题，果树则可以修剪，生产中许多人对修剪的作用认识模糊，稀里糊涂的剪，并不知道为啥要剪，出现问题在所难免。枝组在树冠内的配置做到上稀下密，内外稀中间密。初果期多培养两侧及背后的平斜枝组，盛果期后要适当多利用背上的直立枝组，以维持枝组的生长势。低定干，基部枝位低，长势旺，而且若按要求开张角度，基部枝将贴近地面，这样结果不理想、背上枝更旺，且影响果园的其它生产管理工作采用自由纺锤形树形的植株，不必培养大型枝组。鲁丽苹果苗夏季修剪是缓和幼旺树长势，促进花芽分化和早期丰产的一项重要措施，要充分加以应用。

旺长辅养枝在春梢停长后和秋梢开始生长时，可进行拿枝，使枝条的木质部伤而不断，从而改变角度、方向和生长势。主枝过粗过大，超过主干的二分之一；侧枝过大超过主枝的二分之一或三分之一；背上枝组过大，形成树上树；枝头枝组过大严重影响光照和扰乱树形旺长无花或少花的幼树还可采用春刻伤、夏环剥和秋拉枝的方法，促使成花。由于没有根据这一原则正确把握树冠扩大与开张角度的轻重缓急关系，注重了树冠扩大，对开张角度未引起足够的重视，加之，基部枝太低，不便开张，上部枝又不好操作春刻伤是指春季萌芽前在浦养枝或侧生枝两侧及背后的芽上方进行刻伤，促使多萌芽；格拉芙薰衣草：花穗纤长，花期为春末至初夏，植株与其它狭叶薰衣草相比较。紫色花束”薰衣草：花柄纤长，银绿色叶片，花期为初夏，花色为鲜艳的紫色，是制作切花、干花的。和其它薰衣草一样，喜欢较干旱的环境，需要注意土壤的排水。贝蒂蓝薰衣草：花穗大，呈深蓝紫色，花期为春末至初夏，生长习惯特别适合精致的小花园。薰衣草花什么时候开？薰衣草的开花时间通常是在六月份。

夏环剥是在5月下旬到6月上旬在主干上方或主枝、辅养枝的基部进行环剥或环割3~4圈，使在环剥口上万多积累养分，促进成花；秋拉枝是在秋梢停长前后拉大枝条的开张角度，有利于缓和枝势。而有些果园虽然进行了落头，但由于方法不当出现这样那样的问题，一些果园出现落头过急反旺的情况自由纺锤形树形侧生枝的诱引也多在这一时期中进行。秋梢停长后20天左右，对辅养枝采用剪梢和回缩内膜枝组，也可减缓幼旺树的长势，并使小枝复壮。

鲁丽苹果苗进入盛果期后，当逐步转入以枝组结果为主时，对多年生长的辅养枝要逐年清理、回缩和改造。一些果园由于管理不当或病虫害的原因出现偏冠，有些果园特别是干性较弱的品种，出现歪干现象，严重影响果园群体结构和经济要效益；许多果园有上大下小的问题，上部枝条多而旺，严重遮光，下部枝条光照差，难以成花结果，即所谓“上有天棚遮太阳，下面枝条不见光”特别是树冠郁闭的，要逐年落头开心和打开层间，使光透入内膛。为稳定结果防止大小年，当然，不同的立地条件，对整形修剪要求也不一样，生产中这方面的问题比较多。冬剪时要控制和保持一定的花芽和叶芽的比例达1:2~4)。花芽过多之年，可采取疏芽、短截、回缩和破顶，并配合疏花疏果，不使结果过量，从而促进发枝。花芽较少之年，则尽量多保留花芽结果。

生产当中还应该考虑果品生产目标等其他因素，确定合理的枝量对结果枝组要不断更新复壮，疏弱留壮，细致更新，保持结果能力。总之，通过修剪要使结果枝与营养枝之间保持一定的比例。

大体使每年结果枝的数量不超过总枝数的

30%~40%。养分运输路线太长，无效消耗太多，费工费力当株间外围枝头开始交接，

对延长枝原则上不再短截，可缩编放放，始终保持有一个生长势较强的带头枝。当树体渐趋衰老，外围新消生长量在30厘米以下时，况且，这种树形成形是一步一步的，上一步工作没有做到位，直接影响到下一步的工作，所有这些都会影响到最终结果枝的形成而影响结果要及时回缩骨干枝到2~4年生部位的分叉处，促进树冠较大的更新复壮。