

新疆石河子良凤花鸡苗批发 阿勒泰青脚麻鸡苗 昌吉芦花鸡苗供应 黑鸡苗

产品名称	新疆石河子良凤花鸡苗批发 阿勒泰青脚麻鸡苗 昌吉芦花鸡苗供应 黑鸡苗
公司名称	贵州伟静鸿农业科技发展有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组
联系电话	18786077743 17369032651

产品详情

我国大部分地区夏季闷热多雨，气温偏高，天气多雨。高温高湿会导致鸡体热调节困难，体热平衡破坏，引起热应激，同时免疫机能下降。严重时发生中暑。

夏季气温高，鸡的采食量少，营养摄取量不足，容易引起营养代谢病。

夏季气温高、雨水多、湿度大，易发以腹泻为主要症状肠道性疾病，如大肠杆菌、沙门菌、魏氏梭菌、球虫、新城疫病毒等。各种病原微生物在适宜的条件下感染机而引起腹泻;也可由于饲料的变换、温湿度变化等导致肠道内环境发

生改变，使肠道内菌群平衡失调，有可能发生肠道性疾病;疫苗免疫、气候突变、热应激等各种应激因素导致鸡体抵抗力下降，各而发生肠道性腹泻。

鸡球虫、鸡蛔虫、线虫感染等寄生虫病在高温、潮湿季节发病率高。如球虫在气温23 ~ 30 的潮湿环境中发育良好，5~9月份球虫病发病率高，以6~8月份严重。

夏季蚊、蝇、蜚、螨等有害昆虫多，作为许多鸡病的传播媒介，通过叮咬，会造成某些鸡病的发生。如鸡住白细胞原虫成熟的卵囊含有很多孢子，聚集在库蠓的唾液内，库蠓叮咬通过血液时可传染给鸡，库蠓滋生繁殖的炎热季节多发生鸡住白细胞原虫病。

夏季雨水多、玉米、小麦等粮食、饲料等易发霉变质，鸡采食后易发霉菌中毒。

二、做好疾病防控措施

1、搞好环境卫生

夏季蚊虫和微生物活动猖獗，雨水较多，粪便和饲料容易发酵，环境容易污染。应注意搞好环境卫生，每周带鸡消毒2~3次，控制蚊蝇滋生，定期驱除体内寄生虫，保证鸡体健康。

2、防暑降温

夏季气温高，影响鸡的食欲、饲料的转化率、鸡的产蛋率、孵化率等生产性能。防暑降温是夏季的工作重点。鸡对高温的适应能力很差，防暑降温是夏季管理的关键环节。尤其夏季中午场地地面温度高，如果不注意采取防暑措施，鸡会出现不适反应，如气温超过31℃，鸡张口喘气，活动减少，采食量下降，饮水增多。让鸡在有树荫的地方活动、休息，也可在散养地设置凉棚，为鸡提供防晒乘凉避雨的场所。

3、防止潮湿

夏季多雨，容易造成饲养场地潮湿。林地排水设施完善，排水沟畅通，场内不能存在积水。雨后及时检查修复围栏。经常更换舍内垫料，以保持舍内相对干燥。舍内地面可铺草木灰，可以吸潮并有一定的消毒作用。

4、防止饲料霉变

饲料应存放于干燥、通风处，不能长时间积压。自配饲料应注意添加防霉剂。

5、科学饲养

供给充足、清凉饮水。夏季天气炎热，鸡的饮水量增加。要给鸡提供充足的清凉、洁净的饮水。把饮水器放在树荫下，避免阳光直射，及时更换饮水，给鸡饮用凉水以减轻高温对鸡的影响。还可在饮水中添加碳酸氢钠、氯化铵等抗热应激制剂，减轻热应激的危害。

调整日粮，改善饲喂措施。炎热环境导致鸡的采食量减少，生产性能下降，可适当调整日粮，以补偿因高温引起的营养摄入量的减少，满足鸡的营养需要。在放养地适当增加饮水器数量，运动场和鸡舍内保证有充足的饮水器和食槽，利用早晨和傍晚天气凉爽时补料，让鸡群尽可能地多吃料，保证有足够的营养摄入。

6、加强管理

在高温天气傍晚让鸡在鸡舍前场地活动乘凉，晚入鸡舍;降低饲养密度;夏季暴风雨较多，要在雷雨之前，将鸡赶回鸡舍或让其在遮雨棚下避雨。

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌鸡苗，黑乌鸡苗，鸭苗，鹅苗，新广K9鸡苗