

# 奇早大樱桃苗枝条类型及特性

产品名称	奇早大樱桃苗枝条类型及特性
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

一般在6月底前后对樱桃树主枝延长枝留40厘米进行剪截，可发3~5个发育枝，其他枝条可进行连续摘心控制长势，要让葡萄盆栽植物长得漂亮、也要结许多果，还要靠修剪了。由于长在盆栽花盆的藤条愿意获得充足的营养物质，就不可以长得太伟岸，必须会为主茎的生长发育和结果空出充足的营养物质。增加分枝。酸樱桃的根系主要分布在20~50厘米深的土层中，且实生根比茎源根分布得深；充分挖掘品种优势，有效控制品种缺陷，做到扬长避短，方能大发挥出品种优良特性，体现出品种的市场价值。

对于樱桃浇水，提倡小水勤浇，如果条件允许，可以采取滴灌，尽量避免大水漫灌。樱桃的吸收根对土壤水较为敏感，大水漫灌容易造成这些根系缺氧甚至死亡，另外，大水漫灌还破坏土壤团粒结构，在中国分布于西藏东南部至台湾，湖北至海南岛等地区。生长于海拔90-2400米的疏、密林下荫湿的灌木丛中。富贵子喜温暖、通风、湿润和半阴的环境。不耐寒，怕强光暴晒。生长适温13~27℃，冬季温度不低于5℃。对土壤要求不严，但以土层疏松湿润、排水良好和富含腐殖质的酸性或微酸性的沙质壤土或壤土上并有荫蔽下生长良好。造成土壤板结，这也不利于大樱桃的根系代谢、生长。合理的水肥管理是决定樱桃产量和质量的重要前提，一般来说分两个阶段。

开花过多,养分消耗过大,不仅加重了樱桃的生理落果，影响果实的正常发育，形成许多小果、次果，浇水是养护植物要点中的重点，养死花卉多是因为浇水不当所致，所以大家在浇水上应当多花一些心思。富贵子的浇水一般遵循“见干见湿，浇水浇透”的原则，春季保持盆土湿润，夏季天气干燥保持盆土湿润同时要多向叶面喷水，秋冬两季保持盆土微湿润即可。还会削弱树势，易受冻害和感染病害，并使翌年减产造成小年。