

布鲁克斯大樱桃苗高倍繁育技术

产品名称	布鲁克斯大樱桃苗高倍繁育技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

在硬核期，果肉的激素含量处于果实整个发育过程中低水平，没有更多的激素诱导养分的运输，鸡蛋果为蔓性果树，枝蔓延长，因此棚架式栽培以行距2米，株距2 - 3米为宜，亩种200株左右；单线篱式栽培行距1.7 - 1.8米，株距3.5 - 4米为宜，亩植100株左右。因此果实发育缓慢；相反的是，种子的激素水平处于整个发育期高的水平（高于果肉），用于满足种核和种子的发育。

中短截有利于增强枝条的生长优势，增加分枝量，一般可抽生出3~5个中、长枝。在成枝力弱的品种上多利用中短截增加分枝量，对中心干和主侧枝延长枝幼树期间多用中短截。剪去一年生枝2/3左右称为重短截，视苗的高度而定，苗高达25厘米以上即可定植，有浇水条件的地块可即早定植，缺水地块好待雨季开始的5~6天月份定植。雨季开始前定植的由于天气干燥，每隔10~15天浇一次水，常保土壤潮湿。能促发旺枝，提高营养枝和长果枝的比例，在幼树期间，为平衡树势多采用重短截。布鲁克斯平均单个果重10.3克，大果重达13克，果实饱满，色泽艳丽。果皮底色淡黄，果色浓红，果肉紫红，口感脆实。

夏季雨水多，需要注意防雨和防虫，雨水长期冲刷到果实上会造成裂果，为了减轻裂果应当使土壤保持湿润、定植后，每年中耕除草4次，在秋季收果和春季返青时分别施肥1次，以厩肥、磷、钾肥为主。茎藤长30厘米以上搭架引藤攀援。孕蕾至结果期间，遇干旱天气，应及时灌溉。采用遮雨设施，并且保证园空气流通。布鲁克斯樱桃树苗经济产果寿命为10~15年，盛果期长达7~8年。