

黑珍珠大樱桃苗定植前的小妙招

产品名称	黑珍珠大樱桃苗定植前的小妙招
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

摘心可控制旺枝，增加小枝量，利于提早结果。同时由于枝条生长充实，冬季不容易抽条。夏剪主要是在5月中旬至7月上旬进行除萌、摘心、疏剪及绑缚，及时抹去主干上的萌芽，安排枝蔓空间。雄株修剪在5 - 6月花后进行。每株留3 - 4个枝，每条枝留芽4 - 6个，当新梢长1米时摘心。黑珍珠樱桃适宜在土层深厚、土质疏松、通气良好的砂质壤上栽培。一般3年开始结果，盛果期大概7-8年。

选用一年生主干部分和粗壮的侧枝，粗度0.8~1.3cm，剪成长度13~15cm的条段作为砧木。一园地选择建设樱桃园，应选择阳光充足，交通方便，坡度小于25度，地下水位低，排水良好，土层深厚，土质疏松肥沃，有灌溉条件的砂质壤土或壤土建园樱桃开花早在，当果实可溶性固形物含量6% - 7%时为采收适期，而需要长期贮藏的果实则要求达7% - 10%。早采，风味不佳。采收宜在无风的晴天进行，雨天、雨后以及露水未干的早晨都不宜采收。采摘时间以上午10点前气温未升高时为佳。贵阳市一受倒春寒危害，在建园时要注意选择受害较轻的地块，不要选择低洼地等！另外，樱桃树根系前一受风害，原址还需选在背风地段。

黑珍珠樱桃自花结实率高，可不配授粉树。但为了获得更可靠的产量，可按1：8配植授粉树，一般在花后1个月进地疏果。留中间果，疏边果，达到每4 - 5片叶留1个果。一般枝每20厘米留果1 - 2个，弱枝20 - 25厘米留果5 - 6个。株产50kg，应留果500 - 600个。目前授粉品种以大红袍樱桃为主。防治麻疹麻疹流行时，给小儿饮用樱桃汁能够预防感染。樱桃核则具有发汗透疹解毒的作用。