

四川本地土鸡苗 成都纯种土鸡苗批发 宜宾乌骨鸡苗 泸州青脚麻鸡苗

产品名称	四川本地土鸡苗 成都纯种土鸡苗批发 宜宾乌骨鸡苗 泸州青脚麻鸡苗
公司名称	贵州伟静鸿农业科技发展有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:青脚麻鸡苗 体重:4.6 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金华村一组
联系电话	18786077743 17369032651

产品详情

1.热应激因素

笼养模式下，饲养密度大，温度相对较高，鸡舍内的温度难以调整到适宜温度，肉鸡长期生活在这样的环境下会发生热应激反应，会出现一系列的不良反应，其中明显的就是采食量下降。主要原因是：鸡在采食饲料后会产热，这会增加额外的温度，而鸡出于自我保护，就会减少采食。夏季高温肉鸡饮水量增加，通过饮水排泄带走热量，而大量的饮水会造成肠道内的菌群失调，从而降低了肉鸡胃肠的蠕动功能，使消化能力下降，导致采食量下降。

2.饲养管理因素

为了达到降温的目的，经常会使用水帘，时机把握不准的情况下，肉鸡易受凉，风机开启不当，风机端风速过大，风机与进风口的匹配不恰当，造成风机端温度过高，这些都会造成采食量的下降。

3.饲料因素

颗粒的硬度、大小等对于肉鸡的采食量影响很大，饲料的硬度越大，则肉鸡的采食量越少，颗粒越大，采食量越高。由于霉菌的客观存在，在储存和饲喂过程中，容易造成饲料中霉菌含量超标，当霉菌在体内沉积到一定程度，诱发腺肌胃炎以及肝炎综合征，严重影响鸡群采食。

4.疾病因素

肉鸡在后期的生长速度过快抗病能力较差，会出现一个抗体效价低的阶段，此时易受病原的侵害而患病，所以生长后期的疾病预防尤为关键。

5.生理因素

肉鸡新陈代谢较快，汗腺不发达，高温情况下会加快肉鸡的心跳速度，使其较其他动物更易发生因热应激而造成的采食量下降。

怎样提高肉鸡的采食量

- 1.在适宜的温度范围内。低温条件下鸡的食欲好、采食多。
- 2.要重视日粮的全价性，提高日粮的适口性。
- 3.鸡具有喜食颗粒料的习性，且颗粒料进入嗉囊后容易软化破碎，缩短了采食、消化的时间，鸡容易增加饥饿感而增加了采食量，故有条件的应尽量喂给颗粒料或破碎料。
- 4.建立良好的条件反射。定时定点喂料，有利于肉用仔鸡建立采食条件反射，保持旺盛的食欲，从而增加了采食量。同时注意不突然更换饲料品种。
- 5.自由采食、自由饮水的情况下，少喂勤添，不喂霉变饲料，保证饮水，经常保持有良好的食欲，这也是提高肉用仔鸡采食量的有效办法。
- 6.改进食槽，按鸡龄大小提供结构合理的食槽，根据鸡龄和体重大小调整料槽高度。食槽应放在固定的干净地方。

夏季肉鸡采食量下降的原因是很多的，我们要了解为什么，找准原因，用正确的方法提高肉鸡的采食量。

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌鸡苗，黑乌鸡苗，鸭苗，鹅苗，新广K9鸡苗