

巨峰葡萄葡萄苗批发价，巨峰葡萄葡萄苗价格一览表

产品名称	巨峰葡萄葡萄苗批发价，巨峰葡萄葡萄苗价格一览表
公司名称	泰安高新区北集坡创隆园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	规格:一年生葡萄苗 产地:山东 高度:30
公司地址	山东省泰安市北集坡街道季家庄村
联系电话	18763831510 18763839889

产品详情

巨峰葡萄葡萄苗批发价，巨峰葡萄葡萄苗价格一览表

红提葡萄篱架主干形栽培技术是葡萄生产的一种新模式，具有好管理、省工省力、树势健壮稳定、通风透光良好、病害轻、上色快、成熟早、品质优的特点。为了使大家不走弯路少出错，达到1年栽植树成形，2年投产可丰收，3年高产高效益的目标，根据笔者调查研究和两年来的生产实践，现将红提葡萄篱架主干形栽培新技术要点介绍如下，供同仁参考。

1、科学定植栽

红提葡萄最好选用郑州果树研究所培育的比达砧木嫁接苗，按株距0.9~1 m，行距2.8~3 m栽植，每667 m²定植260~220株。栽植前作好规划，制备立杆，每667 m²需35~40根。立杆高3 m，地下埋0.5 m，地上0.9 m处开始每隔0.5 m留有一道穿钢丝孔。顶端向下10 cm处也留一孔作为将来搭遮雨篷、防鸟网备用。同时要深翻改土，培肥地力。最好随深耕一次性每667 m²施入8~10 m³有机肥并配施两袋蒙鼎底肥或蒙鼎生物菌剂。栽时要保证土壤墒情充足，苗木要进行修根，再用300倍21%过氧乙酸溶液浸泡消毒3~5 min后栽植。注意砧木苗不可栽的过深，要把砧木段露出地面5 cm，防止接穗段生根降低防冻效果。栽后及时整畦浇水。

2、促早发芽、快生根、快长苗

苗木定植后，进行浇水、中耕、平整畦面，然后地膜覆盖。幼苗生长期每10~15 d施一次冲施肥。每667 m²需蒙力28两桶和氮、磷、钾比为20:20:20的高效水溶肥优聪素15

kg，分4~5次施用。根据土壤湿度大小，每667 m²地冲施时可加水150~400 kg，用施肥枪打到距根颈50 cm外膜下。叶喷M-1FN 1500倍液3~4次，可与农药混喷。栽植苗不剪裁、不定干，等苗木发出新芽后，选择一个生长健壮的枝芽，在芽前的枝条上用毛线绳绑到第3道钢丝上，引导枝条快速向上生长。前期枝蔓达不到一定生长量时，采取不掰芽、不去叶，所萌生的枝蔓一律不动，以增加早期叶面积，促进地下地上生长。当枝蔓长山西果树SHANXIFRUIT

2015(3)出一定数量的二次枝和叶面积时，疏除主干下部50 cm以内所有枝芽。当枝蔓长到一定高度时，进行绑蔓，绑蔓不去叶，不打尖，即时剪须。各节位所萌生的二次枝任其自然生长。当主蔓生长高度达到1.6 m以上时(超出2道钢丝)，要在1.4 m处剪裁。剪口下节位上叶片以达手掌大小为佳。主蔓剪梢后上部抽生的一个枝继续引向上方生长，长度达到40 cm时打顶。下部萌发的二次枝全部保留，最上边一处长到一定长时绑到第3道钢丝上。这样当年基本成形。当二次枝长到10~14片叶时摘心，摘心部位下叶片也要达手掌大小，二次枝各节位上所发出的新梢一律留两片叶摘心。

3、控长促壮，促使花芽分化

8月中旬主蔓长到1.6~1.8 m时，解开绑束落架，使主蔓从基部10 cm高处向前一株方向倾斜，与地面夹角为30°，然后再从距离根部50 cm远处将前边枝蔓重新竖直绑到架杆的3道钢丝上。若到时有个别株高达不到预期目标，也要落架、变向缓势，促使已有的二次枝蔓基部冬芽发育成花。同时控制氮肥，减少浇水，不旱不浇水，旱了隔行浇一半。每667 m²冲施高效水溶性高磷高钾冲施肥5 kg。叶喷300~500倍的高磷高钾水溶肥，10 d一次，共3~5次。

4、加强病虫害防治

重点保叶，防治葡萄霜霉病侵染，兼防灰霉病和绿盲蝽、臭椿象等。萌芽期喷21%过氧乙酸(青园)300倍液十龙丽乐1000倍液;幼叶展开后喷10%苯醚甲环唑(千绿)1500倍液十霹雳马8000倍液。5月中旬喷脒鲜氨2000倍液十络安4号600倍液十1.8%阿维菌素4000倍液;6月上旬喷稀酰马林1500倍液十络安5号300倍液十龙丽乐1500倍液。6月下旬喷硫酸铜:生石灰:水=1:0.5:200的半量式波尔多液，每10~15 d喷一次，连喷3~4次。

5、重视冬季修剪和埋土防寒工作

篱架主干形栽植当年冬季修剪技术非常简单，就是不留二次枝，剪成单干，第2年全部利用主干上冬芽萌发的新梢结果。冬剪时间以立冬至小雪为佳，最迟在防寒埋土前1周剪完。株高达到或超过1.8

m，且第3道钢丝下枝段已成熟老化，就在距第3道钢丝下15 cm处剪掉上边所有枝蔓，剪口芽上方留2~3 cm桩，以保护剪口芽。再疏掉下边距地面高度50 cm主干段上所有二次枝(不留芽眼保护桩)，如果单株生长不良，上部枝条老化程度差，就要在老化枝段处定干去头，下年继续培养主干。主干50 cm以上到第2道钢丝段为第2年的有效结果部位，选择6~8个健壮二次枝(基部直径达0.8 cm最好)留1 cm台剪疏掉，其他二次枝不留桩疏剪。冬剪后地上冻前要完成埋土防寒工作，并向取土沟浇足水，再划锄保墒。