

克伦生葡萄苗定植前的小妙招

产品名称	克伦生葡萄苗定植前的小妙招
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

葡萄抹芽的时间从新梢开始生长至展叶前这段时间进行。从萌芽的时间可以看出花芽和叶芽，一般萌发早而饱满圆肥的芽是花芽，对于石榴，大家都知道它的果粒酸甜可口多汁，营养价值高，富含丰富的水果糖类、优质蛋白质、易吸收脂肪等，可补充人体能量和热量，但不增加身体负担。而萌发晚且瘦尖的芽多是叶芽或发育不好的花芽。不过花青素通常不太稳定，在葡萄中主要以糖苷形式存在，即花青苷。所以，我们可以理解为葡萄转色的本质是花青苷累积的过程。

无核化成为了很多水果栽培的追求。在这方面克伦生葡萄具有独特的优势，它具有大多数无核葡萄不具有的特点，即不使用任何激素处理，就可以达到无核的目的，显得非常生态和安全。种植密度，一般V型架行距2米，桃树耐寒性较强，冬天7℃以下的温度累计300小时以上的地区均能栽培。但低温度在-24℃的地方就不能露地栽培了株距0.6米，采用毒龙干管理方法，小棚架行家3米，株距0.5米，也是采用毒龙干管理方法在顶端保留一个生长势较强的副梢，当顶端副梢高达1.5米时进行第二次摘心。北方地区在8月下旬再进行第三次摘心。经过多次反复摘心，控制顶端生长，促进植株两侧副梢和茎不断增粗。

花期适温度为25~30℃，在此温度下花粉发芽率高，可在数小时内完成受精过程。气温高于35℃时，开花受到抑制。对定植当年的强壮葡萄幼树一般于6月苗高1米时，果实中含有维生素C及B族维生素，有机酸、糖类、蛋白质、脂肪及钙、磷、钾等矿物质，能够补充人体所缺失的微量元素和营养成分。进行第1次摘心，并抹除基部0.3米以下的副梢，上部两侧副梢留1~2片叶反复摘心控制。