

凉山州土鸡苗批发 攀枝花青脚麻鸡苗价格 甘孜州乌骨鸡苗 肉鸡苗供应

产品名称	凉山州土鸡苗批发 攀枝花青脚麻鸡苗价格 甘孜州乌骨鸡苗 肉鸡苗供应
公司名称	成都天鑫力禽业有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:鸡苗 体重:4.6 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 18030449395

产品详情

一 病原及流行特点

传染性喉气管炎病毒(ILTV)属于疱疹病毒科疱疹病毒属，双股DNA，有囊膜。病毒大量存在于病鸡的气管组织及其渗出物中。

本病主要侵害鸡，不同年龄的鸡均易感，但以成年鸡的症状为明显。野鸡、孔雀、幼火鸡也可感染。病鸡和康复后的带毒鸡是主要传染源。病毒存在于气管和上呼吸道分泌物中，通过咳出血液和黏液经呼吸道传播。被病鸡污染的饲料、饮水和垫料都可成为本病的传播媒介。康复鸡可带毒长达2年。接种活苗的鸡可在较长时间排毒，若与易感鸡长时间接触，也可感染发病。本病在易感鸡群内传播迅速，感染率可达90%，病死率为5%~70%不等。

二 临床症状

潜伏期为6~12天。急性病例的特征症状是鼻孔有分泌物和呼吸时发出湿性罗音，继而咳嗽和喘气。严重病例，呈现明显的呼吸困难，咳出带血的黏液，有时死于窒息。检查口腔时，可见喉部黏膜上有淡黄色纤维索性凝固物附着：病鸡迅速消瘦，鸡冠发紫，有时排绿色稀粪，衰竭死亡。

发病比较缓和的鸡群其症状为生长迟缓，产蛋下降、流泪、结膜炎、眶下窦肿胀，发病率仅为2%~5%，病鸡多死于窒息。

三 病理变化

主要病变为喉头和气管黏膜充血和出血。喉部黏膜肿胀，有出血斑，并覆盖黏液性分泌物，有时这种渗出物呈干酪样假膜，可能会将气管完全堵塞。炎症也可扩散至支气管、肺和气囊或眶下窦。比较缓和的病例，仅见结膜和窦内上皮的水肿及充血。

四 诊断

本病常突然发生，传播快，成年鸡发生多。发病率高，死亡率因条件不同差别较大。临床症状较为典型，张口呼吸，喘气有罗音，咳嗽时可咯出带血的粘液。气管呈现卡他性和出血性炎症病变。症状不典型时，可进行实验室检查。

五 防控

本病目前尚无的药物治疗，发病鸡群常采用隔离、消毒、对症治疗的措施，对于出现症状的病鸡，可用镊子去除喉头和气管上端的干酪样假膜，可使症状得到缓解。为防止鸡群继发感染，可在饲料或饮水中添加适量的抗菌药物。

1 免疫接种

预防接种鸡传染性喉气管炎疫苗是目前控制本病的有效方法。常用的疫苗主要是鸡传染性喉气管炎弱毒疫苗，经点眼、滴鼻免疫，临床使用较安全，无不良反应。在本病流行地区，可通过点眼接种弱毒疫苗免疫鸡群。次免疫时间为4周龄左右，6周后进行第二次免疫。另有报道可使用传染性喉气管炎灭活苗进行免疫接种，但其效果尚未确定。

需要注意的是，由于接种疫苗能使鸡带毒，一般仅在该病流行地区使用。

2 防继发感染

发病时，可对症治疗，并用抗菌药物防止继发感染。饲养管理用具及鸡舍要进行消毒。病愈鸡不可与易感鸡混群饲养。

处方1：链霉素5万~10万IU，注射用水适量；用法：一次肌肉注射，每日2次，连用3~5天。说明：呼吸困难时，也可一次肌肉注射20%樟脑水注射液0.5~1mL。

处方2：病毒灵20~40g，用法：拌入100kg饲料中喂服，连喂3~5天。

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，天露黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌骨鸡苗，肉鸡苗，新广K901鸡苗，黑鸡苗