

红巴拉多葡萄苗高成活率移栽技术

产品名称	红巴拉多葡萄苗高成活率移栽技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

夏季修剪在展叶初期进行抹芽，在新梢长28厘米左右、花穗可见时定梢，在初花期进行摘心。每亩留新梢3300枝，以每个新梢留1~2个花穗的原则进行疏穗，每平方米架面留花穗4~5个，过弱新梢不留穗，过旺新梢可以留2个花穗。使每平方米架面控制产量在1.5~2公斤，每亩产量1250~1500公斤。每1结果枝留1穗，弱枝不留穗，基部新梢作营养枝，不留穗。

多主蔓扇形架式通常适合在埋土防寒地区采用，其特点是早果性强，修剪技术运用灵活，较易掌握；小棚架龙干形是一种丰产树形，但前期产量低；当主梢长至7叶1心时，留7叶一次性打顶，花序以下及花序以上第1至第三个副梢全部抹除，其他副梢可留1~2叶打顶。顶端长出的梢留3叶打顶，再长的梢留4叶打顶，然后强控使顶端不再抽梢，使主梢长90厘米左右。顶端叶片与避雨棚膜应留有一定距离，避免叶片发生日灼。单干双臂水平形和“T”字形则结合了篱架和棚架的优点；H形则是一种更为优良的架式。红巴拉多葡萄不属于自然无核的葡萄品种，这也是它的一个重要缺点，如果不进行无核化处理，红巴拉多葡萄在激烈市场竞争中很难有好的价格。花前在花序分离期结合施肥浇一遍水，有利于花穗拉长，这期间一定要配合叶面喷施硼钙叶面肥

疏粒，标准耳重随着品种的不同而变化，主要是稀疏发育不良，j变形，果实生锈或疤痕果实和果实过度密集，花前尽早疏除副穗和穗基部2~3个小穗，基部过大穗的顶端要切除，过密的果穗要疏除部分小穗，开花前1周左右打掉穗尖，留7~8厘米长花穗，小花数300~350朵。坐果后及时疏除过密果粒，穗重控制在400~500克。去除次耳，主耳基部2~4耳和耳尖。采收时果实的果糖含量略高于葡萄糖，由于果糖的甜度高，因而含果糖高的葡萄风味甜，而含葡萄糖高风味较淡。