

红巴拉多葡萄苗生长期温度管理技巧

产品名称	红巴拉多葡萄苗生长期温度管理技巧
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

大棚葡萄盖膜，应适时通风，气温稳定超过20 时除围裙。萌芽后至新梢生长期白天温度应保持在28%左右，着色肥，转色期每亩施硫酸钾20公斤、农用硝酸铵钙12.5公斤，可有效增强果肉硬度，提高果品耐贮运性及商品性。采果肥，每亩施10公斤复合肥。夜间温度12 左右，湿度控制在60%左右。选用具有高活性的硼钙液的硼钙肥更好，硼钙的吸收转化好、效果好。

要根据架式的优缺点，针对每株树每个枝组的实际情况进行修剪。但无论采用什么架式，必须在生长期完成枝组配置，冬剪时主要进行枝组更新。使耳朵更紧凑，水果大而整洁。保留水果的要求取决于品种。挂果后每年施5次肥。基肥，在10月底至11月上旬，每亩施腐熟鸡粪1000公斤，缓效高钾、中氮、低磷复合肥25公斤。萌芽肥，萌芽前10~15天，每亩施硫酸镁25公斤、硼砂4公斤。果实膨大肥，第1次谢花期，每亩施高钾型复合肥25公斤，10天后进行第二次施肥，每亩施农用硝酸铵钙12.5公斤、硫酸钾20公斤。火焰无核要求为450-500g，平均单粒重为49，clozone物质为20%，粉红山药蜂蜜要求为500-700g，平均单粒重为7g。 ，可溶物质为18%或更多

葡萄定植发芽后出现一片真叶时，开始抹芽，当新梢长到25-30厘米高时引绑在竹竿上。虽然可以使用赤霉素、夏黑生长势强,花芽分化很好,充实的细枝条也能抽生花穗。叶片挺立,叶色深绿,光合效率高,栽培管理容易,促成栽培效果更好。可用扦插或嫁接繁殖。吡效隆等植物激素进行无核化处理，但是果实的品质会有所下降。