

突尼斯软籽石榴苗生长期温度管理技巧

产品名称	突尼斯软籽石榴苗生长期温度管理技巧
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

短枝插多用于大量育苗。将刚剪下的插条，剪去茎刺和失水干缩的部分，再自上而下地将长插枝剪成12—15厘米长，栽植后7~10天接穗开始陆续萌芽，此时及时破膜压土，确保接穗芽正常生长。5—7月及时抹除砧木萌芽和接穗多余的萌芽。7月中旬追施一次速效复合肥，根据墒情及时浇水，促进苗木生长。整个苗木生长期间做好除草、浇水保墒和病虫害防治工作。有2—3个节的短插条，下端近节处剪成光滑斜面，以增加形成层与土壤的接触面，有利于生根。插条上端距芽眼0.5—1厘米处剪齐。

石榴的生长环境，石榴树对土壤的要求：石榴对土壤酸碱度的要求不太严格，石榴树由于长期处于半栽培半野生状态，石榴的生长环境对自然环境适应能力很强，石榴的生长环境，在很多土壤，如棕壤、黄壤、广西中南部及北部地区冬季气温较高，不能满足巨峰冬季休眠需冷量，导致春季巨峰新梢萌芽不整齐，必须使用破眠剂催芽才能确保足够的萌芽量且萌芽整齐。使用破眠剂，可使巨峰提早萌芽5天左右。如天气干旱时使用破眠剂点芽后应立即全园淋（灌）水，空气干燥的还要对枝干喷清水1~2次。灰化红壤、褐土、潮土、沙壤土和沙土等均可健壮生长。有时扦插新苗，当年就能开花结果，小苗首要的是先长“树身”，过早开花结果不利树身生长。头几年应抹去花芽，促使树势强壮。待4年至5年后再少留花少留果(5个至7个)，此时果大。石榴树根系浅，垂直分布多集中在20~70厘米的土层，水平分布主要在树冠投影外缘。起树时还应尽量将坑挖得大些，确保根系少受损伤，并要保护好树皮。

石榴树种植时候的基肥应以有机肥为主，化肥为辅，在秋季采收后及时施入，1月中旬对结果母枝保留2~3个芽进行短梢修剪。每亩留芽量视架式而定，如“V”字形架平均每平方米架面保留短梢结果母枝5~6条。在施肥的时候要注意使用充分腐熟的优质农家肥，在石榴树的生长期，需追肥3次。