

突尼斯软籽石榴苗高倍繁育技术

产品名称	突尼斯软籽石榴苗高倍繁育技术
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

石榴的生长环境，石榴树对温度的要求：石榴属喜温树种，喜温畏寒，好。
石榴树在旬气温10度左右时树液流动，11度时萌芽、抽枝和展业，日气温为24-26度授粉受精良好

一般大树移栽都用吊车装卸、汽车运输。大树吊运是大树移栽的重要环节之一，直接关系到树木的成活、树体树形的完美等。装车时注意不要将土球碰碎，尽量做到随起、随运、随栽。运输距离远，当主梢展开5~6片叶时，如树势过旺可全园喷洒0.5%磷酸二氢钾和1000~1400毫克/升矮壮素混合液，每隔5~7天喷一次，共喷1~2次，促进花芽分化。生长旺盛果园，矮壮素的使用浓度应适当提高，反之，则适当降低。主梢保留7~8片叶摘心，摘心后对主梢顶端萌发的一个副梢留3~4片叶摘心，其余副梢全部抹除；要采取保湿措施，避免失水。第1次追肥应在石榴萌芽到现蕾初期，第2次追肥在石榴幼果的膨大期，第3次追肥在石榴果实转色期，喷施调色师钛肥，促进石榴干物质的积累，帮助石榴着色增甜，防晒防裂，提升石榴的品质。

突尼斯软籽石榴在每年8月上旬开始变红，进入8月中旬，便开始成熟了，到了9月上旬完全成熟，副梢摘心后立即喷一次0.5%磷酸二氢钾和矮壮素1000~1400毫克/升的混合液，促进枝梢芽眼饱满。当主梢顶端冬芽饱满时，剪除顶端副梢，促使主梢顶端一个冬芽萌发形成冬芽副梢，冬芽副梢萌发后一般都会带有花序。口感是上等的。花器发育和果实生长在很大程度上受营养状况的支配。营养不足使果树的花器发育不良，形成退化花、畸形花，开花后即脱落。