

天露黑鸡苗养殖场 快大型黑鸡苗孵化场 天露黑5鸡苗欢迎前来考察

产品名称	天露黑鸡苗养殖场 快大型黑鸡苗孵化场 天露黑5鸡苗欢迎前来考察
公司名称	成都天鑫力禽业有限公司
价格	.00/只
规格参数	品种:黑鸡苗 体重:4.6 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 18030449395

产品详情

由于在预混料生产过程中，生产工艺的流程、药物的配比、营养物质的添加量及时间的掌握、药物与营养素之间的拮抗作用、保存及运输因素的影响，肉鸡在饲养过程中饲喂预混料常常会表现出各种各样的非正常问题。现将一些出现的常见问题及成因列出，同时提出一些对策，供广大饲养户参考。

一 腹水

主要指由多种因素引起的肉仔鸡腹腔中积聚多量的浆液性液体。成因很多，营养因素如硒、维生素E、磷缺乏；高能、高蛋白配合饲料等。管理因素如舍内环境差、通风不良、氨浓度高；高原气候、氧气稀薄；环境封闭、缺氧、二氧化碳浓度过大；霉变饲料；疾病因素如继发大肠杆菌病、曲霉菌病等。

对该病的防治主要应从饲养管理入手，注重矿物质、维生素合理配比、量充足；改善饲养环境，减少密度，加强卫生和通风，勤换垫料，搞好环境消毒；补充维生素E和硒，常用1ppm亚硒酸钠液，任其自饮，同时辅以维生素E丸。在饲养早期使用抗菌药物，防止和减少大肠杆菌病和曲霉菌病的发生。努力减轻鸡的应激反应，不断提高鸡的抗病能力，可通过拌料，按50毫克/千克量添加维生素C和复合维生素。

二 猝死

主要是指发病急、突发性暴死或急性死亡。原因有日粮中蛋白质和脂肪含量过高；铜、锌含量偏高；硒不足；维生素与矿物质搭配不合理；光照强度过强、饲养密度大；通风不良；心血管系统、呼吸系统、消化系统等尚未完善与快速生长相矛盾等。

对该病的防治应合理配制日粮，从第二周适当限饲，料中蛋白质含量小于20%，多种维生素(尤其是VBI、vB6、VA、vD、vE)和矿物质含量要充足，脂肪含量不能太高。可在每10千克料中添加3毫克生物素。在控制光照方面，从第二周起12~16小时，22~42日龄18小时，42日龄后20小时，同时不能随意开、关灯。在10~21日龄，每吨饲料添加3~4克碳酸氢钾，连用3天。

三 腿软

主要指肉鸡表现不能站立、腿脚畸形、行走困难的一种表现。

营养因素：饲料中缺锰、胆碱、烟酸、叶酸、生物素、尼克酸；大剂量补充磷、氯、硫；饲料中缺某种氨基酸、单宁；VD₃缺乏、VD不充足、钙磷不足或配比不当；VBI、vB₂、vE缺乏；锌缺乏。

管理因素：饲养方式不合理如育雏笼养；运动不足。疾病因素如佝偻病等

对该病的防治应做好如下方面：合理配制日粮，保证每天摄入足量的维生素和微量元素，2~3周每千克饲料中含有2000IU的VD、1%钙、0.5%有效磷；严禁饲喂霉变饲料；加强管理，控制疾病或应激的发生；育雏期采用地面平养；投喂大量四环素类药物能影响钙、磷的吸收，磺胺类药物影响叶酸的吸收，注意添加与平衡。

四 异嗜

主要指啄羽、啄肛。

营养因素：蛋氨酸、胱氨酸缺乏；盐分过高或过低；日粮中纤维含量偏低；料中大容积性饲料偏小；饲料中缺乏vA、vD、VE、vB₂和某些微量元素如钙、镁、锌等。

管理因素：饲养密度大；舍内温湿度不适；通风不良；光照太强或太弱；应激。

疾病因素：球虫病、蠕虫病；拉稀；某些药物如抗球药用量偏高。

对该病的防治，应合理配制日粮，营养成份要全面；选择适宜抗球虫药；消除应激因素；正确判断病因，采取相应措施。

五 跗关节肿大

主要指病鸡的单侧或双侧性跗关节炎性肿胀。